

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十七上

評校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣莊承賢

欽定四庫全書

本草綱目卷十七

草之六

毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

蘭茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

葭蓉

本經即  
天仙子

雲實

本經

蓖麻

唐本博  
落迴附



常山蜀漆

本經  
土紅山附  
吐莖山

藜蘆

本經  
果根  
山慈石  
馬腸根附  
參

木藜蘆

拾遺

附子

本經

已上卷十七上

天雄

本經

側子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟弱

開寶  
薩草附  
菩

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經  
不蘆附  
押

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經  
山躑躅  
羊不啮草附

芫花

本經

薺花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵陳

本經

石龍芮

本經  
胡椒菜

毛茛

拾遺  
每蘆附

牛扁

本經  
建草附  
虱

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目  
山根附  
遠

鉤吻

本經

已上卷十七下

右附方舊一百三十四新四百九十五

本草綱目卷十七目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十七上

明 李時珍 撰

草之六

毒草類一十七種

大黃

本經下品

釋名黃良

本經

將軍

當

火參

吳普

膚如

吳普弘景曰大黃

其色也將軍之號

號

號

當取其駿快也果曰推陳致新如戩定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解

別錄曰

大黃生

河西山谷及隴西二月八月采

根火乾

普曰生蜀郡北郡或隴西二月八月采

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

黃

赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五月實黑  
八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今采益州北  
部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦  
色味甚苦濇色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦  
有大乾者皮小焦不如西耐蛀堪久此藥至勁利粗  
者便不服恭曰葉子莖並侶羊蹄但莖高六七尺  
而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦侶宿羊蹄  
大者乃如盬長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳  
作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩  
穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北  
者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣  
藏器曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可  
用蜀中侶牛舌片緊硬者若取瀉洩駿快推陳去熱  
者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆  
有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土苴大  
黃正月內生青葉侶蓖麻大者如扇根如芋大者如



盤長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃  
花亦有青紅侶蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月  
采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛  
舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土  
大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言  
蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若益藥市以大者  
為枕紫地錦文也今人以莊浪出者為  
最莊浪即古涇原隴西地與別錄相合

**正誤**

須曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癩甚效初生  
苗葉累年長大即葉侶商陸而狹尖四月內抽

條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小  
五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰  
乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰  
蘇說即老羊蹄根也因其侶大黃故謂之羊蹄大黃  
實非一類又一種酸模乃山大黃也狀侶羊蹄而  
生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根修治

雷曰凡使細切以丈如水旋斑緊重者剉片  
蒸之從已至未晒乾又酒臘水蒸之從未至

亥如此凡七次晒乾却洒淡蜜水再蒸一伏時其大  
黃必如烏青樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有  
熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石煔  
乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙蒸煮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒  
扁鵲苦無毒李當之大寒元素曰味

苦氣寒氣味俱厚沈而降陰也用之須酒浸煨熟者  
寒因熟用酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用  
酒果曰大黃苦峻下走用之于下必生用若邪氣在  
上非酒不至必用酒浸引上至高之分驅熱而下如  
物在高巔必射以取之也若用生者則遺至高之邪  
熱是以愈後或目亦或喉痺或頭腫或膈上熱疾生  
也時珍曰凡病在氣分及胃寒血虛并姪娘產後並  
勿輕用其性苦寒能傷元氣耗陰血故也之才曰黃

苓為之使無所畏權  
曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血閉寒熱破癥瘕

積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中

化食安和五臟

經本

平胃下氣除痰實腸間結熱心腹

脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結

別錄

通女子

經候利水腫利大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩

熱蝕膿

甄權

通宣一切氣調血脈利關節泄壅滯水氣

溫瘴熱瘧

大明

瀉諸實熱不通除下焦濕熱消宿食瀉

心下痞滿

元素

下痢赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥

結潮熱譫語黃疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚志忘心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉宗

真曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用之無不效惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不明說而云邪熱客之何以明仲景之

意而開悟後人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明  
手足厥陰五經血分之藥凡病在五經血分者宜用  
之若在氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣  
不足吐血衄血者乃真心之氣不足而手足厥陰心包  
絡足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖  
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下痞  
滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉脾胃  
之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作痞滿乃  
寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘在于心故  
曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致為痞滿又云濁  
氣在上則生膈脹是矣病發於陽而反下之則成結  
胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分野仲景大陷胸湯  
丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若  
結胸在氣分則只用小陷胸湯痞滿在氣分則用半  
夏瀉心湯矣成無已註釋傷寒論亦不知分別此義  
成無已曰熱淫所勝以苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀

熱下燥結而泄胃強頌曰本草稱大黃推陳致新其  
效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處  
尤多古人用毒藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置  
非一切輕用也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰  
大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委  
頓梁元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣  
通僧坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝  
從之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶  
中便謂此方神奇其差誤則  
不言用藥之失可不戒哉

附方

舊十四新  
三十七

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者  
瀉心湯主之大黃二兩黃

連黃芩各一兩水三升煮一升  
熱服取利張仲景金匱玉函  
吐血刺痛兩為散每

服一錢以生地黃汁一合水半盞  
煎三五沸無時服簡要濟衆方  
傷寒痞滿病發於陰而反

下之心下滿而不痛按之濡此為痞也  
大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩以麻沸湯二升漬之

須臾絞汁分作二次  
**熱病譫狂** 川大黃五兩剉炒微溫服仲景傷寒論赤為散用臘雪水五

升煎如膏每服半匙  
**傷寒發黃** 方同上氣壯者大冷水下聖惠方黃一兩水二升漬一

宿平旦煎汁一升入芒消一兩  
**腰脚風氣** 作病大黃緩服須臾當利下傷寒類要二兩切如

碁子和少酥炒乾勿令焦搖節每用二錢空心以水  
三大合入薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷腹惡

物即痛止  
**一切壅滯** 崔經治痞悶消食化氣導血元亮海上方

用大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧  
子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一二

十九  
**衛生寶鑑** 用皂莢熬膏和丸名墜痰丸  
又名全真丸金宣宗服之有驗賜名保安丸痰為

百病

用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃芩八兩沈香

半兩青礞石二兩以焰消二兩同入砂鍋固濟煨紅

研末二兩右各取末以水和九梧子大常服一二十

丸小病五六十九緩病七八十九急病一百二十九

溫水吞下即卧勿動候藥逐上焦痰滯次日先下糟

粕次下痰涎未下再服王隱君歲合男女諸病無極

四十餘斤愈疾數萬也養生主論

婦人經血不通赤白帶下崩漏不止腸風下血五淋

產後積血癥瘕腹痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱

等證其效甚速宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分

作四分一分用童尿一盃食鹽二錢浸一日切晒一

分用醇酒一盃浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒

同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盃浸

一日切晒一分用當歸四兩入淡醋一盃同浸一日

去歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空心溫



酒下取下惡物為驗未下再服此武心腹諸疾三物  
當高士孫碧雲方也 醫林集要 備急

九治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一兩  
搗篩蜜和搗一千杵九小豆大每服三九凡中客卒  
忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死者以暖  
水或酒服之或灌之未知更服三九腹中鳴轉當吐  
下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即瘥此乃仲  
景方司空裴秀改為散用不及九也 圖經本草 腹

中痞塊

大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和煎九梧子  
大每服三十九生薑湯下吐利為度 外臺

秘要 腹脇積塊

風化石灰末半斤瓦器炒極熱稍冷入  
大黃末一兩炒熱入桂心末半兩畧炒

下米醋攪成膏攤布貼之 又方大黃二兩朴消一  
兩為末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一兩尤妙

心法 丹溪

久患積聚

二便不利上搶心腹脹滿害食大  
黃白芍各二兩為末水丸梧子大

每湯下四十九日三脾癖疳積不拘大人小兒錦紋

以知為度千金方蓋沙鍋內文武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再

研用舶上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻

十歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之後再服

若不忌口不如勿小兒無辜或疳疔疔瘡或頭乾黃聾

服聖濟總錄小兒無辜大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中

用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盪中於

大鑊內浮湯上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中

三歲兒一服七九梧子大日再服以下出青赤膿為

度若不下或下少稍稍加丸若下多又須減之病重

者七八劑方盡根大人亦可用之此藥惟下宿膿不

令兒利也須禁食毒物乳母亦禁小兒諸熱大黃煨

之一加木香一兩半崔知悌方小兒諸熱大黃煨

之一加木香一兩半崔知悌方小兒諸熱大黃煨

各一兩為末煉蜜九麻子大每服五九至十  
九蜜湯下加黃連名三黃九錢氏小兒方骨蒸積

熱漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合煎取四  
合去滓空腹分為二服如人行五里再服廣利

方赤白濁淋頂入藥攪勻蒸熟空心食之不過三個破

愈方簡相火秘結大黃末一兩牽牛頭末半兩每服  
三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服劉諸痢初起大黃煨熟當歸各二三錢  
河間保命集壯人各一兩水煎服取利

或加檳榔熱痢裏急大黃一兩浸酒半日忽喘悶絕  
集簡方煎服取利集簡方

不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕而復蘇  
名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩水二盞煎一盞

熱服可安食已即吐胸中有火也大黃一兩甘草  
危氏得效方二錢半水一升煮半升溫服

仲景金婦人血癖作痛大黃三兩酒二升煮產後

血塊大黃末一兩頭醋半升熬膏九梧子大每乾血

氣痛錦大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升熬成

紅漏自下乃調經仙藥也婦人嫁痛小戶腹痛也大

煮一沸頓服男子偏墜作痛大黃末和醋塗濕熱眩

運不可當者酒炒大黃為末茶清服小兒腦熱常欲

大黃一分水三合浸一夜一歲兒服半合暴赤目痛

餘者塗頂上乾即再上姚和衆至寶方

四物湯加大黃酒煎胃火牙痛口含冰水一口以紙

服之傳信通用方

喘鼻立止

儒門事親

### 風熱牙痛

紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃

瓶內燒存性為末早晚揩牙漱去都下一家專貨此藥兩宮常以數千贖之其門如市也千金家藏方

### 風蟲牙痛

齧常出血漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黃各旋切一片合定貼上一夜

即愈未愈再貼忌說話恐引入風

### 口瘡糜爛

大黃粘麝等分為末擦之吐涎

### 惠鼻中生瘡

生大黃杏仁搗勻猪脂和塗又方生大黃黃連各一錢麝香少許為末生油

### 調搽仙茅毒發

古服出口方見仙茅下

### 傷損瘀血

三因方雞鳴散治從

高墜下木石壓傷及一切傷損瘀凝積痛不可忍並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三七粒細研酒一盞煎六分雞鳴時服至曉取下瘀血即愈和濟方治跌壓瘀血在內服滿大黃當歸等分炒

研每服四錢溫酒打撲傷痕瘀血滾注或作潮熱者

服取下惡物愈大黃末薑汁調塗一夜

黑者紫二夜紫者白杖瘡腫痛大黃末醋調塗之童

也瀕湖集簡方尿亦可調醫方摘

玄金瘡煩痛大便不利大黃黃芩等分為末蜜九

瘡破爛大黃末水調塗湯火傷灼莊浪大黃生研蜜

又且滅癰此乃金山寺神灸瘡飛蝶因灸訖火

人所傳方洪邁夷堅志便退瘡內鮮肉

片飛如蝶形而去痛不可忍是火毒也大黃朴蠟消各半兩為末水服取利即愈張果醫說

咬瘡大黃末塗火丹赤腫遍身者大黃磨水腫毒初

起大黃五倍子黃蘗等分為末新癰腫炊熱作痛大

汲水調塗日四五次簡便方

調塗之燥即易不過數易即乳癰腫毒金黃散用川退甚驗神方也時后方

一兩為末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰卧仍先以溫酒服一大匙明日取下惡物婦人經驗方

大風癩瘡大黃煨一兩皂莢刺一兩為末每服方寸匕空心溫酒下取出惡毒物如魚腦狀未

下再服即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄黃花蛇藥名通天再造散十便良方

葉氣味酸寒無毒主治置薦下辟風蟲相感志

商陸本經下品

釋名遂莠音逐當陸開寶圖白昌開寶馬尾廣雅夜呼

本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰遂莠訛為商陸又訛為當陸北音訛為章柳或云枝枝相值葉葉相

當故曰當陸或云  
多當陸路而生也

集解

別錄曰商陸生成陽川谷如人形者有神恭曰  
此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有

毒保昇曰所在有之葉大如牛舌而厚脆赤花者根  
赤白花者根白二月八月采根日乾頌曰俗名章柳  
根多生於人家園圃中春生苗高三四尺青葉如牛  
舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘿  
蔔而長八九月采之爾雅謂之遠蕒廣雅謂之馬尾  
易經謂之萑陸數曰一種赤昌苗葉絕相類不可服  
之有傷筋骨消腎之毒惟花白年多者仙人采之作  
脯可下酒也時珍曰商陸昔人亦種之為蔬取白根  
及紫色者擘破作畦栽之亦可種子根苗莖並可洗  
蒸食或用灰汁煮過亦良服丹砂乳石人食之尤利  
其赤與黃色者有毒不可食按周憲王救荒本草云  
章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生



植

根修治

數曰取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆葉一重商陸

一重如此蒸之從午至亥取出去豆葉暴乾剉用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒

別錄曰酸權曰甘有大毒忌犬肉大明曰白者苦冷得大蒜良赤者有毒

能伏礪砂砒石雌黃拔錫恭曰赤者但可貼腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神張仲景曰商陸以水服殺人果曰商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

主治水腫疔

瘕痺熨除癰腫殺鬼精物

本經

療胸中邪氣水腫痿痺

腹滿洪直䟽五臟散水氣

別錄

瀉十種水病喉痺不通

薄切醋炒塗喉外良

甄權

通大小腸瀉蠱毒墮胎熗腫

毒傳惡瘡

大明

發明

弘景曰方家不甚用惟療水腫切生根雜鯉魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能去尸

蟲見鬼神其實子亦入神藥花名芑花尤良頃曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根竹筴盛掛屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服云神仙所秘法也時珍曰商陸苦寒沈也降也陰也其性下行專於行水與大戟甘遂蠱異性而同功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利者以赤根搗爛入射香三分貼于臍心以帛束之得小便利即腫消又治濕水以指畫肉上隨散不成文者用白商陸香附子炒乾出火毒以酒浸一夜日乾為末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮汁服亦可其莖葉作蔬食亦治

腫疾嘉謨曰古讚云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言盡之矣

附方

新舊九

濕氣脚軟

樟柳根切小豆大煮熟更以綠豆同煮為飯每日食之以瘥為

度最效斗門方

水氣腫滿

外臺秘要用白商陸根去皮切如豆大一盞以水二升煮一

升更以粒米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食千金髓用白商陸六兩取汁半合和

酒半升看人與服當利下水取效梅師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取六升去滓和葱豉作

之腫食腹中暴癥

有物如石痛刺啼呼不治百日死多取商陸根搗汁或蒸之以布籍腹上

安藥勿覆冷即易晝夜勿息孫真人千金方

瘥癖如石

在腸下堅硬生商陸根汁一升杏仁

一兩浸去皮搗如泥以商陸汁絞杏泥大煎如飴每服衆許空腹熱酒服以利下惡物為度聖惠方

產後腹大

堅滿喘不能卧白聖散用樟柳根三兩大戟一兩半甘遂炒一兩為末每服二三錢

熱湯調下大便宜利為度此乃五尸注痛腹痛脹急主水聖藥也潔古保命集

上攻心胸旁攻兩脇痛或礪塊涌起用商小兒痘毒陸根熬以囊盛更互熨之取效肘後方

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹弩氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱

白搗傳臍上斑止痘出耳卒熱腫生商陸削尖納入方免無虞摘玄方聖濟錄

喉卒攻痛商陸切根炙熱隔布熨之療癰喉痺攻痛冷即易立愈圖經本草

陸根搗作餅置瘰上以艾炷于一切腫毒商陸根和上炙三四壯良外臺秘要鹽少許搗

傳日再易之石癰如石堅硬不作膿者生商陸根搗真人千金方搗擦之燥即易取軟為度

亦治濕漏諸癰  
張文仲方  
瘡傷水毒  
商陸根搗炙布裏熨之  
冷即易之  
千金方

莠花主治人心昏塞多忘喜卧取花陰乾百日搗末

日暮水服方寸匕乃卧思念所欲事即於眠中醒悟

也

蘇頌

狼毒

本經  
下品

釋名

時珍曰觀其  
名知其毒矣

集解

別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采  
根陰乾陳而沈水者良弘景曰宕昌亦出之乃

言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山  
者今用出漢中及建平云與防葵同根但置水中沈

者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳  
恭曰今出秦州成州秦亭原在二州之界秦隴地寒  
元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢  
中亦不聞有陶說謬矣志曰狼毒葉似商陸及大黃  
莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為力  
劣秦亭在隴西奉高是太山下縣陶云沈者是狼毒  
浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實  
得水皆沈狼毒春夏采者輕虛得水皆浮且二物全  
別不可比類此與麻黃橘皮半夏枳實吳茱萸為六  
陳也保昇曰根似玄參惟虛浮者為劣也頌曰今陝  
西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼  
毒出秦晉地今人往往以草蘭茹為之誤矣見蘭茹  
也下

根氣味辛平有大毒

大明曰苦辛有毒之才曰大豆  
為之使宜醋炒惡麥句薑畏古

斯蜜陀  
僧也

主治欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣惡瘡

鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸

本經

除胸下積癖

別錄

治痰飲癥瘕亦殺鼠

大明

合野葛納耳中治聾

抱朴子

附方

舊四新六

心腹連痛

作服用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜九梧子大一日服一九二

日二九三日三九止又從一九起至三九止以瘥為度肘後方

九種心痛

一蟲二蛙三風

四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證九痛九用狼毒炙香共茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩為末煉蜜九梧子大每空心溫酒下一九和劑局方

腹中冷痛

水穀陰結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食用狼

毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜九梧子  
大每服三九食前白湯下日三服  
時後方  
陰疔

欲死

三兩縮入腹急痛欲死狼毒四兩防風二兩附子  
三兩燒以蜜九梧子大每服三九日夜三度白

湯下

兩脇氣結

方同腹中

一切蟲病

川狼毒杵末  
每服一錢用

空腹服之次早即下蟲也

集效方

乾濕蟲疥

毒

不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被  
蒙頭恐藥氣傷面此維揚潘氏所傳方  
蘭氏經驗

方積年疥癩

狼毒一兩一半生研一半炒研輕粉三  
合水銀三錢以茶末少許於瓦器內以

津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三日待藥沈  
油清遇夜不見燈火蘸油塗瘡上仍以口鼻於藥蓋

上吸氣取效  
永類方

積年乾癬

生疔搔之黃水出每逢陰雨  
即痒用狼毒末塗之  
聖惠



方惡疾風瘡

狼毒秦芫等分為末每服方寸匕溫酒下日一二服千金方

防葵

本經上品

釋名房苑

別錄

梨蓋

本經

利茹

吳普又名爵離方蓋農果恭曰根葉似葵花子根香

味似防風故名防葵

集解

別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日采根暴乾普曰莖葉如葵上黑黃二月

生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三月采根恭曰此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如蔥花景天葦而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者

乃沈水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據

正誤

弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沈爾而狼毒陳

久者亦不能沈矣攷曰凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異故又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙上中生采得二十日便生蟲用之惟經為妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沈為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為誤

根修治

攷曰凡使須揀去蟲末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中

炒至汁盡用

氣味辛寒無毒

別錄曰甘苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無毒權

曰有小毒

主治疰瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆濕瘡癰

癰驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身

本經

療五臟虛氣

小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志中火者不可服令

人恍惚見鬼

別錄

久服主邪氣驚狂

蘇恭

主瘰癧氣塊膀胱

眊宿水血氣瘤大如盤者悉能消散治鬼瘡百邪鬼

魅精怪通氣

甄權

發明

時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服

之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦速矣不可不辨古方治蛇寢鼈寢大方中多用防葵皆是狼毒也

附方

舊一新二

腫滿洪大

防葵研末溫酒服一升主至二三服身臍及小不仁為效肘

后癰狂邪疾

上方同

傷寒動氣

傷寒汗下後臍左有動氣防葵散用防葵一兩

木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半煎八分溫服雲岐子保命集

狼牙

本經下品

釋名牙子

本經

狼齒

別錄

狼子

別錄

犬牙

吳普

抱牙

吳普

支蘭

李當

之弘景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解

別錄曰狼牙生淮南川谷及冤句八月采根暴乾中濕腐爛生衣者殺人普曰葉青根黃赤六

七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙三月八月采根日乾頌曰今江東汴東州郡多有之時珍曰范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣味苦寒有毒

別錄曰酸普曰神農黃帝苦有毒桐君辛岐伯雷公扁鵲苦無毒之

才曰蕪蔑為之使惡地榆棗肌

主治邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白

蟲

本經

治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡

甄權

殺腹臟一切蟲止

赤白痢煎服

大明

附方

舊六新四

金瘡出血

狼牙草莖葉熟搗貼之肘后方

小便溺血

金

狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分為末每服三錢米泔空心調服亦治酒病衛生易簡方寸

白諸蟲

狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不食明旦以漿水下合一服盡即瘥外臺秘要蟲

瘡癰瘻

六月以前采狼牙葉以後用根生咬咀以木葉裹之煆火炮熟於瘡上熨之冷即止楊

炎南小兒陰瘡

狼牙草濃煮汁洗之千金方婦人陰瘡狼牙二兩

兩煎水熱洗外臺秘要婦人陰蝕

瘡爛者狼牙湯用狼牙三兩水四升煮取半升以筋纏綿

浸湯瀝洗日四五遍張仲景金匱玉函

聃耳出汁狼牙研末綿裹日毒

蛇傷螫

獨莖狼子根或葉搗爛臘猪脂和塗立瘥

崔氏方

射工中人

有瘡狼牙冬取

根夏取葉搗汁飲四五合并傳之 千金方

蘭茹

本經下品

釋名離婁

別錄

掘据

音結居

白者名草蘭茹

時珍曰蘭茹本作蘼紫其

根牽引之貌掘据當作拮据詩云予手拮据手口共作之狀也

集解

別錄曰蘭茹生代郡川谷五月采根陰乾黑頭者良昔曰草高四五尺葉圓黃四四相當四月

華五月實黑根黃有汁亦黃色三月采葉四月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草蘭茹色白皆燒鐵爍頭令黑以當漆非真也頌曰今河陽淄齊州亦有之

二月生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之又有一種草蘭茹色白古方兩用之故姚僧坦治癰疽生惡肉有白蘭茹散傳之看肉盡便停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮蘭茹為散半錢和白蘭茹散三錢和傳之觀此則赤白皆可用也時珍曰范子計然云蘆茹出武都黃色者善草蘭茹出建康白色今亦處處有之生山原中春初生苗高二三尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有歧出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微潤不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃單根無漿汁



根氣味辛寒有小毒

別錄曰酸普曰神農辛岐伯酸鹹有毒李富之大寒之才曰甘

草為之使惡門冬

主治蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿惡血

除大風熱氣善忘不寐

本經

去熱痺破癰瘕除息肉

別錄

發明

宗與曰治馬疥尤善服食方用至少時珍曰素問治婦人血枯痛用烏鰂骨蘆茹二物丸服方

見烏鰂魚下王冰言蘆茹取其散惡血又齊書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蘆茹丸服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾孟詵必効方治甲疽生于脚趾邊腫爛用蘆茹三兩黃芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合日三塗之即消又聖惠方治頭風旋眩總頭丸中亦用之

附方

舊二新二

緩疽腫痛

簡茹一兩為散溫水服二錢匕

聖惠方

傷寒咽痛

毒攻作腫真蘭茹不甲大納口嚼汁中焦熱痞善忘

然之當微覺為佳張文仲備急方

蘭茹二分甘草炙二兩消石為末每服一

錢雞鳴時溫酒下以知為度

聖惠方 疥瘡瘙癢

蘭茹末入輕粉香油

詞傳之多能鄙事

大戟 本經下品

釋名 卽鉅 爾雅 下馬仙 綱目 時珍曰 其根辛苦戟人咽

利人甚速也 郭璞注 爾雅云 薔卽鉅 卽大戟也

集解 別錄曰 大戟生常山十二月采根陰乾保昇曰

苗似甘遂而高大紫有白汁花黃根似細苦參

皮黃肉黃白五月采苗二月八月采根用頊曰近道

多有之春生紅芽漸長叢高一尺以來紫似初生楊

柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑  
根似細苦參秋冬采根陰乾淮甸出者莖圓高三四  
尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥時  
珍曰大戟生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有  
白漿葉長狹如柳葉而不團其梢葉密攢而上杭州  
紫大戟為上江南土大戟次之北方綿大戟色白其  
根皮柔韌如綿甚峻利能傷人  
弱者服之或至吐血不可不知

### 根修治

教曰凡使勿用附生者誤服令人洩氣不禁  
即煎薺芩湯解之采得後于槐砧上細剉與

海芋葉拌蒸從已至申去芋葉曬乾用海芋葉麻而有毒恐不  
得以漿水煮熟去骨晒乾用  
也可用也

### 氣味苦寒有小毒

別錄曰甘大寒權曰苦辛有大毒  
元素曰苦甘辛陰中微陽瀉肺損

真氣時珍曰得衆即不損脾之才曰反甘草用菖蒲解之恭曰畏菖蒲蘆華鼠尿大明曰赤小豆為之使惡薯預主治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼

痛吐逆

本經

頸腋癰腫頭痛發汗利大小便

別錄

瀉毒藥

泄天行黃病溫瘧破癥結

大明

下惡血癖塊腹內雷鳴

通月水墮胎孕

甄權

治隱癰風及風毒脚腫並煮水日

日熱淋取愈

蘇頌

發明

成無己曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也好古曰大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝者苦

燥除之也時珍曰痰涎之為物隨氣升降無處不到入于心則迷竅而成癰癩妄言妄見入于肺則壅蔽

而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則留伏蓄聚而成  
脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻痺疼痛入于筋  
骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛陳無擇三因方  
並以控涎丹主之殊有奇效此乃治痰之本痰之本  
水也濕也得氣與火則凝滯而為痰為飲為涎為涕  
為癖大戟能泄臟腑之水濕甘遂能行經隧之水濕  
白芥子能散皮裏膜外之痰氣惟善用者能收奇功  
也又錢仲陽謂腎為真水有補無瀉而復云痘瘡變  
黑歸腎一證用百祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其  
腑則臟自不實愚按百祥惟用大戟一味大戟能行  
水故曰瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥  
非獨瀉腑正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大  
戟味苦瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治  
嗽而能吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景  
亦云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者十棗湯主之  
其中亦有大戟夫乾嘔脇痛非肝膽之病乎則百祥

之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補况瀉青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉腑乎潔古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是瀉子之意蓋毒勝火熾則水益涸風挾火勢則土受虧故津血內竭不能化膿而成青黑乾陷之證瀉其風火之毒所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾者非也腎之真水不可瀉瀉其陷伏之邪毒爾

附方

新十一

百祥膏

治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發寒者宜下之不黑

者慎勿下紅芽大戟不拘多少陰乾槳水煮熟去骨日乾復納原汁盡焙為末水九粟米大每服一二十丸研赤脂麻湯下潔古活法機要裏變百祥丸治痘瘡變黑大便閉結用大戟一兩棗三枚水一盃同煮暴乾去大戟以棗肉焙控涎丹治痰涎留在胸九服從少至多以利為度

病或頸項胸背腰脇手足膝髀隱痛不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺似乎癱瘓不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麴糊丸梧子大每服七丸或二十九以津液嚥下若取利則服五水腫喘急小便瀉及水蠱大戟炒六十丸三因方水腫喘急二兩乾薑炮半兩為散每服三錢薑湯下大小水病腫滿不問年月淺深大便利為度聖濟總錄水病腫滿戰當歸橘皮各一兩切以水二升煮取七合頓服利下水二三升勿怪至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不復作此方出張尚客李水氣腫脹大戟一兩廣木香半兩為絳兵部手集末五更酒服一錢半取下碧水後以粥補之忌鹹物簡便方用水腫腹大如大戟燒存性研末每空心酒服一錢七

或過身浮腫用棗一斗入鍋內以水浸過用大戟根  
苗益之瓦盆合定煮熟取棗無時食之棗盡決愈  
又大戟散用大戟白牽牛木香等分為末每服一錢  
以猪腰子一對批開慘末在內濕紙煨熟空心食之  
左則塌左右則塌右牙齒搖痛大戟咬於痛處  
張潔古活法機要牙齒搖痛良生編中風

澤漆  
本經下品

釋名漆莖本經貓兒眼睛草綱目綠葉綠花草綱目五鳳草

弘景曰是大戟苗生時摘葉有白  
汁故名澤漆亦噉人餘見下

集解別錄曰澤漆大戟苗也生太山川澤三月三日  
七月七日采莖葉陰乾大明曰此即大戟花也



川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采之頌曰  
今冀州鼎州明州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏  
皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可  
食然大戟苗洩人不可為菜今考土宿本草及寶藏  
論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉綠花草  
一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分  
枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如苜蓿葉圓而黃綠  
頗似貓睛故名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖  
五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一  
故又名五鳳草綠葉綠花草掐莖有白汁粘人其根  
白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮  
雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非  
大戟苗也今方家用治水蠱脚氣有效尤與神農本  
文相合自漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之  
爾用者

宜審

莖葉氣味苦微寒無毒

別錄曰辛大明曰冷有小毒之才曰小豆為之使惡薯蕷

主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不

足

本經

利大小腸明目輕身

別錄

主蠱毒

蘇恭

止瘡疾消痰

退熱

大明

發明

時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩人而

澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利大夫陰氣盛不相侔也

附方

舊二新六

肺欬上氣

脈沈者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升

去滓人半夏半升紫參白前生薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日三服張

仲景金匱 心下伏瘕 大如盂不得食者澤漆四兩大

要畧方 大每服二九日三十腫水氣 澤漆十斤夏月取嫩莖

服 葛洪肘後方 斗於銀鍋內慢火焚如稀錫入瓶內收每日水氣蠱

病 生鮮貓眼睛草曬乾為末裹肉九彈子大每服二

坤秘 腳氣赤腫 行步脚痛貓兒眼睛草驚驚藤蜂窠

之 衛生 牙齒疼痛 貓兒眼睛草一搗研爛湯泡取

男婦瘰癧 貓兒眼睛草一二細井水二桶五月五日

碗瓶收每以椒蔥槐枝煎湯洗瘡淨 癬瘡有蟲 貓兒

草晒乾為末香油調搽之  
衛生易簡方

甘遂

本經下品

釋名甘藟

別錄

陵藟

普

陵澤

別錄

甘澤

普

重澤

別錄

苦澤

普

白澤

普

主田

別錄

鬼醜

普

名義多未詳

珍曰

諸

集解

別錄

曰甘遂

生中山

川谷

二月

采根

陰乾

普曰

八月

采弘景曰

中山在代郡

第一本出太山江

東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者部下亦有名草甘遂殊惡蓋贗偽者也恭曰甘遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者良草甘遂乃是蚤休療體全別苗亦不同俗名重臺葉似鬼白蓖麻根皮白色大明曰西京者上汴滄吳者次之形似和皮甘草節頌曰今陝西江東亦有之苗似澤漆莖短小

而葉有汁根皮赤肉  
白作連珠大如指頭

### 根修治

敷曰凡采得去莖於槐砧上細剉用生甘草湯薺菴自然汁二味攪浸三日其水如黑汁

乃漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出于土器中熬脆用之時珍曰今人多以麪煨熟用以去其毒

### 氣味苦寒有毒

別錄曰甘大寒普曰神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有毒元素曰純陽也

之才曰瓜蒂為之使惡遠志反甘草

主治大腹疝瘕腹滿面目浮腫留

飲宿食破癥堅積聚利水穀道

本經

下五水散膀胱留

熱皮中痞熱氣腫滿

別錄

能瀉十二種水疾去痰水

甄權

瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰迷癲癇噎膈

痞塞

時珍

發明

宗輿曰此藥專于行水攻決為用元素曰味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處乃泄

水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用時珍曰腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹連臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調傳腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相反而感應如此清流韓詠病脚疾用此一服病去七八再服而愈也

附方

舊三新

水腫腹滿

甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半為末水煎時時呷之

普濟

膜外水氣

甘遂末大麥麵各半兩水和作餅燒熟食之取利

聖濟總錄身面

洪腫

甘遂二錢生研為末以穢猪腎一枚分為七瓣入末在內濕紙包煨令熟食之日一服至四五

服當覺腹鳴小便利

肘后方

腎水流注

腿膝痠急四肢腫痛即上方加木香四錢

每用二錢煨熟溫酒嚼下

常正水脹急

大小不利故利黃水為驗御藥院方傳死甘草五錢

半生半炒胭脂脂坏子十文研勻每以一錢白麴四兩水和作碁子大水煮令浮淡食之大小便利後用平

胃散加熟附子每以小兒疳水

珠子甘遂炒青橘皮二錢煎服普濟方

錢以麥芽湯下以利為度忌酸水蠱喘脹

甘遂大戟各一兩慢

火炙研每服一字水半盞煎三  
五沸服不過十服 聖濟錄 水腫喘急 大小便不

用甘遂大戟芫花等分為末以漿肉和丸梧子大每  
服四十丸侵晨熱湯下利去黃水為度否則次午再

服 三 妊娠腫滿 氣急小腹滿大小便不利已服猪  
因方 苓散不瘥者用太山赤皮甘遂二

兩搗篩白蜜和丸梧子大每服五十丸得微下仍服  
猪苓散不再服之猪苓散見猪苓下 小品方

心下留飲 堅滿脈伏其人欲自利反快甘遂半夏湯  
用甘遂大者三枚半夏十二個以水一升

煮半升去滓入芍藥五枚甘草一節水二升煮半升  
去滓以蜜半升同煎八合頓服取利 張仲景金匱

玉 腳氣腫痛 腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩木  
函 鼈子仁四個為末猪腰子一個去皮膜

切片用藥四錢搽在內濕紙包煨熟空心食之米飲  
下服後便伸兩足大便秘行後吃白粥二三日為妙



本事

# 二便不通

甘遂末以生麴糊調傳臍中及丹田  
內仍艾三壯飲甘草湯以通為度又

太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻小便轉脬甘遂末  
分作四服日一服取利聖惠方

苓湯調下立通

# 疝氣偏腫

甘遂苗香等分為末酒  
服二錢儒門事親

筆峯雜興方

# 人血結

婦人少腹滿如敦狀小便微難而不渴此為  
水與血俱結在血室大黃二兩甘遂阿膠各

一兩水一升半煮半升頓服  
服其血當下張仲景方

# 腸氣哽噎

甘遂麴煨五錢為  
南木香一錢為

末壯者一錢弱者五分  
水酒調下怪病奇方

# 痞證發熱

盜汗胸背疼痛甘  
遂麴包漿水煮十

沸去麴以細糠火炒黃為末大人三錢小兒  
一錢冷蜜水卧時服忌油膩魚肉普濟方

# 消渴引

# 飲

甘遂麴炒半兩黃連一兩為末蒸餅九絲豆  
大每薄荷湯下二九忌甘草楊氏家藏方

# 癰瘤

心風

選心丹治風痰迷心癰癩及婦人心風血邪用甘遂二錢為末以猪心取三管血和藥入猪心

內縛定紙裏煨熟取末入辰砂末一錢分作四丸每服一丸將心煎湯調下大便下惡物為效不下再服

生方

馬脾風病

小兒風熱喘促悶亂不安謂之馬脾風甘遂麴包煮一錢半辰砂水飛二

錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油一小點抄藥在上沈下去漿灌之名無價散全幼心鑑

麻木疼痛

萬靈膏用甘遂二兩蓖麻子仁四兩樟腦一兩搗作餅貼之內飲甘草湯摘玄方

耳卒聾閉

甘遂半寸綿裹挿入兩耳內口中嚼少甘草耳卒自然通也永類方

續隨子

宋開寶

釋名千金子

開寶

千兩金

日華

菩薩豆

日華

拒冬

開寶

聯步

日華

葉中出葉數數相續而生故名冬月始長故又名拒冬

**集解**

志曰續隨子生蜀郡處處亦有之苗如大戟頌曰今南中多有北土產少苗如大戟初生一莖

莖端生葉葉中復出葉花亦類大戟自葉中抽幹而生實肯有殼人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀秋實時珍曰莖中亦有白汁可結水銀

**修治**

時珍曰凡用去殼取色白者以紙包壓去油取霜用

氣味辛溫有毒主治婦人血結月閉瘀血癥瘕瘰癧除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡滯物開積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎酒服不實

過三顆當下惡物

本蜀

宣一切宿滯治肺氣水氣日服

十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止又塗疥癬瘡

大明

發明

頌曰續隨下水最速然有毒損人不可過多時珍曰續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似主療亦

相似其功皆長于利水惟在用之得法亦皆要藥也

附方

舊二新四

小便不通

膀胱脹痛不可忍諸藥不效者不過再服用續隨子去皮一兩

鈎丹半兩同少蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月至春末取出研蜜九梧子大每服二三十九木通湯下化破尤妙病急亦可

水氣腫脹

聯步一兩去殼研壓去油重研分作七服每治一人

旋合聖濟錄

用一服丈夫生餅子酒下婦人荊芥湯五更服之當  
下利至曉自止後以厚朴湯補之頻啖益善忌鹽醋  
一百日乃不復作斗門方陽水腫脹續隨子炒去油二  
即續隨子也兩黃一兩為末  
酒水九綠豆大每白湯下五涎積癥塊  
十九以去陳莖摘玄方續隨子三十  
青黛炒一錢研勻糯米飯丸芡子大每服一九打破  
以大棗一枚燒熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後取  
下積聚惡物為蛇咬腫悶欲死用重臺六分續隨子  
效聖濟錄仁七粒搗篩為散酒服方  
寸匕兼唾和少許塗咬處黑子疣贅續隨子熟時塗  
立效崔元亮海上方之自落普濟  
方

葉及莖中白汁主治剝人面皮去黥黯開寶傳白癰癰

瘍

明大

搗葉傳蠍螫立止

時珍

葇岩

音浪蕩  
本經下品

釋名天仙子

經國

橫唐

本經

行唐

時珍曰葇岩一作蘭蕩其子服之令人狂狼放

名  
宕故

集解

別錄曰葇若子生海濱川谷及雍州五月采子弘景曰今處處有之子形頗似五味核而極小

保昇曰所在皆有之葉似崧藍莖葉皆有細毛花白色子殼作罌狀結實扁細若粟米大青黃色六月七月采子日乾頌曰處處有之苗莖高二三尺葉似地黃玉不留行紅藍等而濶如三指四月開花紫色莖莢有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒數曰凡使勿用蒼葇子其

形相似只是微赤服之無效時人多以雜之時珍曰張仲景金匱要畧言菜中有水葇苔紫圓而光有毒或吐血以甘草汁解之中風

子修治

數曰修事葇苔子十兩以頭醋一鎰煮乾為度却用黃牛乳汁浸一宿至明日乳汁黑即

是真者晒乾搗篩用

氣味苦寒無毒

別錄曰甘權曰苦辛微熱有大毒藏器曰性溫不寒大明曰溫有毒服之

熱發以綠豆汁甘草升麻犀角並解之數曰有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生暈火頌曰本經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄川王美人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主卒顛狂亦主治齒痛出蟲肉痺拘急多單用葇苔豈果性寒耶

久服輕身使人健行走及奔馬強志益力通神見鬼

多食令人狂走

本經

療癩狂風癰顛倒拘攣

別錄

安心定

志聰明耳目除邪逐風變白主疥癬取子洗晒隔日

空腹水下一指捻亦可小便浸令泣盡暴乾如上服

勿令子破破則令人發狂

藏器

炒焦研末治下部脫肛

止冷痢主蛙牙痛咬之蟲出

甄權

燒熏蟲牙及洗陰汗

大明

發明

弘景曰入療癩狂方用然不可過劑久服自無  
癩通伸健行足為大益而仙經不見用權曰以



石灰清煮一伏時掬出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸服去一切冷氣積年氣痢甚溫暖也不可生服傷人見鬼拾鍼狂亂時珍曰良莠之功未見如所說而其毒有甚焉煮一二日而芽方生其為物可知矣良莠雲實防葵赤商陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋此類皆有毒能使成迷心竅蔽其神明以亂其視聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以莨菪酒醉而坑之又嘉靖四十二年二月陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美設飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其奸污復將魔法吹入柱耳中柱發狂惠見舉家皆是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執柱囚之十餘日柱吐痰二碗許問其故乃知所殺者皆其父母兄嫂妻子姪姪也柱與如香皆論死世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨菪之流爾方其疾走之時視人皆鬼矣解之之法可

乎不知

附方

萬二新

卒發顛狂

良砒三升為末以酒一升漬數日絞去滓煎令可丸如小

豆三九日三服當見面急頭中如有蟲行顛及手足有赤豆處如此並是瘰癧也未知再服取盡神良

陳延之風痺厥痛天仙子三錢炒大草烏頭甘草半兩五靈脂一兩為末糊丸梧子大

以螺青為衣每服十九男子菖蒲久嗽不止有濃血酒下女子芫花湯下聖濟錄

五錢淘去浮者煮令芽出炒研真酥一雞子大大棗七枚同煎令酥盡取藥日食三枚又方良砒子三

撮吞之日五六度光祿李丞年久呬嗽至三十年者服之神驗孟詵必效方

熏黃等分為末以羊脂塗青紙上微末于水腫蠱脹上卷作筒燒烟熏吸之崔行功纂要方

方見獸部 **積冷痙癖** 不思飲食羸困者莨菪子三分  
麤羊下水 水淘去浮者大棗四十九個水

三升煮乾只取棗去皮核每空心食 **水瀉日久** 青州  
一個米飲下覺熱即止 聖濟錄

十個去核入莨菪子填滿札定燒 **冷疝痢下** 莨菪子  
存性每粟米飲服一錢 聖惠方 為末臘

猪脂和丸綿裹棗許導下部因痢出更 **赤白下痢** 腹痛  
納新者不過三度瘥 孟詵必效方

腸滑後重大黃煨半兩莨菪子炒黑一 **久痢不止** 變  
撮為末每服一錢米飲下 普濟方

種痢兼脫肛莨菪丸用莨菪子一升淘去浮者煮令  
芽出晒乾炒黃黑色青州棗一升去皮核醱醋二升

同煮搗膏丸梧子大每服二 **腸風下血** 莨菪煎用莨  
十丸食前米飲下 聖惠方 若實一升棗

乾搗篩生薑半斤取汁銀鋤中更以無灰酒二升搜  
之上火煎如稠餲即掇投酒度用酒可及五升即止

慢火煎令可丸大如梧子每旦酒飲道下三丸增至

五七九止若九時粘手則以兔絲粉觀陽之火候忌

緊藥焦則失力也初服微熱勿怪疾甚者服過脫肛

三日當下利痰去利亦止絕有效篋中方脫肛

不收莨菪子炒研傳風牙蟲牙一撮入小口瓶內燒

用莨菪子入瓶內以熱湯淋下口含瓶口令氣熏之

冷更作盡三合乃止有涎津可去甚效備牙齒宣

急方用莨菪子數納孔中以蠟封之亦效落風痛莨菪子末綿裹咬風毒咽腫熱水不下及療

之有汁勿嚥必放方風毒咽腫熱水不下及療

驗子末兩錢匕神乳癰堅硬新莨菪子半匙清水一  
臺秘石癰堅硬不作濃者莨菪子為末醋和惡瘡似  
要外壺秘要傳瘡頭根即拔出千金方惡瘡似

癩

十年不愈者 莨菪子 打撲折傷 羊脂調 莨菪子末

惡犬咬傷

莨菪子七枚 吞之 日三服 千金方

根氣味苦辛有毒 主治邪瘡疥癬殺蟲

時珍

附方

新

瘡疾不止

莨菪根燒灰 水服一合 量人強弱用 千金方

惡癬有蟲

莨菪根搗爛蜜和 傳之 千金翼

趾間肉刺

莨菪根搗汁塗之 公炮炙論序云 脚生肉

刺視繫 繫于視帶上也

狂犬咬人

莨菪根和鹽搗傳日 三上 外臺秘要

惡刺

傷人

莨菪根水煎汁浸之 冷 即易神方也 千金方

箭頭不出

萬聖神應丹 端午前一日

不語尋見 莨菪科根本枝葉花實全好者 道云先生 你却在這裏道罷 用柴灰自東南起圓了 以木楔子

掘取根下周迴土次日未出時依前不語用鑿頭  
取出洗淨勿令雞犬婦人見于淨室中以石白搗如  
泥丸彈子大黃丹為衣以紙袋封懸高處陰乾遇有  
箭頭不出者先以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此  
藥放臍中綿兜肚繫了當便  
出也 張子和儒門事親方

雲實

本經上品

釋名員實

別錄

雲英

別錄

天豆

吳普

馬豆

圖經

羊石子

圖經

苗名

草雲母

唐本

臭草

圖經

粘刺

綱目

時珍

曰員

亦音

雲其

義

作

羊矢

其子

肖之故也

集解

別錄

曰雲

實生

河間

川谷

十月

采暴

乾普

曰莖

高四

五尺

大葉

中空

葉如

麻兩

兩相

值六

月花

八月九月實十月采弘景曰處處有之子細如葶藶子而小黑其實亦類葶藶燒之致鬼未見其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如首楷枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶者非也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚殼白仁咬之極堅重有腥氣

### 實修治

敬曰凡采得粗搗相對拌渾  
顆橡實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒

別錄曰苦晉曰神農辛  
小溫黃帝鹹雷公苦

主治泄痢腸

澀殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱

本經

消渴

別錄

治

瘡多用

蘇頌

主下蠱膿血

時珍

附方

新

蠱下不止

雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭  
二兩為末蜜丸梧子大每服五九

水下日三服

肘后方

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經

殺精物下水燒之致鬼

別錄

發明

時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂  
豈有久服輕身之理此古書之訛也



根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之

時珍

蓖麻

蓖音卑  
唐本草

釋名

頌曰葉似大麻子形宛如牛蟬故名時珍曰  
蓖亦作蠅蠅牛虱也其子有麻點故名蓖麻

集解

恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結子  
如牛蟬今胡中來者莖赤高大餘子大如皂莢

核用之亦良保昇曰今在處有之夏生苗葉似葎草  
而大厚莖亦有節如甘蔗高大餘秋生細花隨便結  
實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實  
冬采根日乾用時珍曰其莖有赤有白中空其葉大  
如楓葉每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗紫累黃  
色每枝結實數十顆上有刺攢簇如蠅毛而軟凡三  
四子合成一顆枯時劈開狀如巴豆殼內有子大如  
豆殼有斑點狀如牛蟬再去斑殼中有仁嬌白如續

隨子仁有油可作印色及油  
紙子無刺者良子有刺者毒

子修治

穀曰凡使勿用黑天赤利子緣在地蔓上是  
顛兩頭尖有毒其蓖麻子節節有黃黑斑凡

使以鹽湯煮半日去皮取子研用時珍曰取蓖麻油  
法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撇起待  
沫盡乃止去水以沫煎至  
點燈不炸滴水不散為度

氣味甘辛平有小毒

時珍曰凡服蓖麻者一生不得  
食炒豆犯之必脹死其油能伏

丹砂  
粉霜

主治水癥以水研二十枚服之吐惡沫加至三

十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡痒浮

腫尸在惡氣榨取油塗之

唐本

研傳瘡痂疥癩塗手足

心催生

大明

治療癰取子炒熟去皮每卧時嚼服二三

枚漸加至十數枚有効

宗與

主偏風不遂口眼喎斜失

音口噤頭風耳聾舌脹喉痺齁喘脚氣毒腫丹瘤湯

火傷鉞刺入肉女人胎衣不下子腸挺出開通關竅

經絡能止諸痛消腫追膿拔毒

時珍

發明

震亨曰蓖麻屬陰其性善收能追膿取毒亦外科要藥能出有形之滯物故取胎產胞衣剩骨

膠血者用之時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣味順近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開通諸竅經絡故能治偏風失音口喎口目喎斜頭風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鵝鵝油能引藥氣入內

蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂麝香鯨鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸復熱服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗煖太陽穴一夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用累奏奇効但內服不可輕率開或言搗膏以筋點于驚馬六畜舌根下即不能食或點臍內即下血死其毒可知矣

附方

舊九新二十九

半身不遂

失音不語取蓖麻子油一升酒一斗銅鍋盛油著酒中一

日煮之令熟細細服之外臺秘要

口目喎斜

蓖麻子仁搗膏左貼右貼左即正婦人良

方用蓖麻子仁七七粒研作餅右喎安在左手心左喎安在右手心即以銅盂盛熱水坐藥上冷即換五

六次即正也 一方用蓖麻子仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用風氣頭痛可

忍若乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗 德生堂方用蓖麻油紙剪花貼太陽亦

効 又方蓖麻仁半兩東肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下鼻涕即止 八種頭風 蓖

子剛子各四十九粒去殼雀腦芎一大塊搗如泥糊九彈子大線穿掛風處陰乾用時先將好末茶調成

膏子塗蓋內後將灰火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸葱湯點盪內茶藥服之後以綿被裹頭卧

汗出避風 鼻室不通 蓖麻子仁三百粒大裘去皮一袖珍方 枚搗勻綿裹塞之一日一易三

十日聞香臭 聖濟錄 天柱骨倒 小兒疳疾及諸病後天柱骨也 聖濟錄 天柱骨倒 小兒體虛所致宜生筋散貼

之木鼈子六箇去殼蓖麻子六十粒去殼研勻先包頭擦頂上令熱以津調藥貼之 鄭氏小兒方 五

種風癰

不問年月遠近用蓖麻子仁二兩黃連一兩石膏末一盞文武火煮之乾即添水三日兩

夜取出黃連只用蓖麻風乾勿令見日以竹刀每個切作四段每服二十段食後荊芥湯下日二服終身

忌食豆犯之必腹脹死衛生寶鑑舌上出血蓖麻子油紙撚燒烟熏鼻中自止摘玄方

舌脹塞口

蓖麻仁四十粒去殼研油塗紙上作撚燒烟熏之未退再熏以愈為度有人舌腫出

口外一邨人用此法急喉痺塞牙關緊急不通用此而愈經驗良方即破以蓖麻子仁研

爛紙卷作筒燒烟熏吸即通或咽中瘡腫杜任方用只取油作撚尤妙名聖烟筒蓖麻子仁

一枚朴硝一錢同研新汲水服之連進二三服效三因方用蓖麻仁荊芥總等分為末蜜丸綿包噙嚥

之千金水氣腫滿蓖麻子仁研水解得三合清旦一頓服盡日中當下青黃水也或云壯人

止可服五粒  
**脚氣作痛**  
崑麻子七粒去殼研爛同蘇合香丸貼足心痛即止也

外臺秘要  
**小便不通**  
崑麻仁三粒研細入紙燃內  
**勦喘咳**

嗽  
見崑麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服  
**催生下胞**

崔元亮海上集驗方取崑麻子七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出即以此膏

塗頂則腸自入也  
肘后方云產難取崑麻子十四枚每手各把七枚須臾立下也  
**子宮脫下**

崑麻子仁枯簍等分為末安紙上托入仍以  
**盤腸生**

產  
塗頂方  
**催生下胎**  
不拘生胎死胎崑麻二箇巴豆同上一個麝香一分研貼臍中并足

心  
又下生胎一月一  
**一切毒腫**  
痛不可忍崑麻子粒溫酒吞下集簡方

肘后

癰風鼻塌

手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩到豆

大以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子一枚劈破而東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜猪肉試之如不發是效也若發動再服直候不發乃止

杜任

小兒丹瘤

蓖麻子五個去皮研入麴一匙水調塗之甚效

修真秘旨 瘰癧

結核

蓖麻子炒去皮每睡時服二三枚取效一生不可喫炒豆

阮氏經驗方 瘰癧惡瘡

及軟癰用白膠香一兩瓦器溶化去滓以蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之攪勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得所以緋帛量瘡大肺風面小攤貼一膏可治三五癰也 儒門事親

瘡

起白屑或微有赤瘡用蓖麻子仁四十九粒白果膠聚各三粒瓦松三錢肥皂一個搗為丸洗面用



之良一具  
吳扶壽方

面上雀斑

為未用羊髓和勻夜夜傳之

摘玄  
髮黃不黑

三日後頻刷之  
摘玄方

耳卒聾閉

飽麻子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒  
乳汁和九作錠每以綿裹一枚塞之覺耳中熱為度

一日一易二十  
日凝千金方

湯火灼傷

湯傷以油調火灼以水調

塗之  
今錄驗

古  
鍼刺入肉

處傳之類看若見刺出即拔去

恐藥緊弩出好肉或加白梅  
肉同研尤好衛生易簡方

竹木骨硬

兩凝水石二

兩研勻每以一捻置舌根嚥自然不見  
麻油紅麴等分研細沙糖九皂子大綿裹含嚥痰出

大雞魚骨哽

彈子大井花水化下半九即下

惡犬咬

傷

蓖麻子五十粒去殼以井花研膏先以鹽水洗吹痛處乃貼此膏 袖珍方

葉氣味有毒主治脚氣風腫不仁蒸搗裏之日二三

易即消又油塗炙熱熨顙上止鼻衄大驗

蘇恭

治痰喘

欬嗽

時珍

附方

新

一 齁喘痰嗽

儒門事親方用九尖蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉四兩薄

批揀藥在內荷葉裏之文武火煨熟細嚼以白湯送下名九仙散 普濟方治欬嗽涎喘不問年深日近

用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒各一兩為末蜜九彈子大每服一九白湯化下日一服名無憂丸

附錄博落迴

拾遺錄曰有大毒主惡瘡櫻根腐贅患肉白癰風蠱毒精魅溪毒瘡癰和百

大青雞桑灰等分為末傳之蠱毒精魅當別有法生  
江南山谷莖葉如蓖麻莖中空吹之作聲如博落迴  
折之有黃汁藥人立  
死不可輕用入口

常山

本經蜀漆同  
下品

釋名恒山

吳普

互草

本經

雞屎草

日華

鴨屎草

日華

時珍曰恒

山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真定豈此  
藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用相同今併  
為一

集解

別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月采  
根陰乾又曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢中常

山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都建平紉  
實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是常山苗而

所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾  
彼人采得紫結作丸得時燥者佳恭曰常山生山谷  
間莖圓有節高者不過三四尺葉似茗而狹長兩兩  
相當二月生白花青萼五月結實青圓三子為房其  
草暴燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣保昇曰  
今出金州房山梁州中江縣樹高三四尺根似荆根  
黃色而破五六月采葉名蜀漆也李含光曰蜀漆是  
常山莖八月九月采之頌曰今汴西淮浙湖南州郡  
亦有之並如上說而海州出者葉似楸葉八月有花  
紅白色子碧色似山楝子而小今天台山出一種草  
名土常山苗葉極甘人用為飲甘味如  
蜜又名蜜香草性涼益人非此常山也

修治

數曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以甘  
草細剉同水拌濕蒸之臨時去甘草取蜀漆細

到又拌甘草水勻再蒸日乾用其常山凡用以酒浸  
一宿漉出日乾熬搗用時珍曰近時有酒浸蒸熟或

瓦炒熟者亦不甚吐  
人又有醋制者吐人

常山氣味苦寒有毒

別錄曰辛微寒普曰神農岐伯  
苦桐君辛有毒李當之大寒權

曰苦有小毒炳曰得甘草吐瘧之才曰  
畏玉札大明曰忌葱菜及菰菜伏砒石主治傷寒寒

熱熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆

經本

療鬼蠱往來水

脹洒洒惡寒鼠瘻

別錄

治諸瘧吐痰涎治項下瘤癭

甄權

蜀漆氣味辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒元  
素曰辛純陽炳曰桔梗為之使

之才曰枯樓為  
之使惡貫衆

主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞積

聚邪氣蠱毒鬼疰

經本

療胸中邪結氣吐去之

別錄

治鬼

瘡多時溫瘡寒熱下肥氣

甄權

破血洗去腥與苦酸同

用導膽邪

元素

發明

數曰蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之頌曰常山蜀漆為治瘡之最要不可多

進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒時珍曰常山蜀漆有劫瘡截瘡之功須在發散表邪及提出陽分之後用之得宜神效立見用失其法真氣必傷夫瘡有六經瘡五臟瘡癰濕食積瘴疫鬼邪諸瘡須分陰陽虛實不可一槩論也常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯁鯉甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草果檳榔

則入脾蓋無痰不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或停滯心下或結癖脇間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用水在上焦則常山能吐之水在腸下則常山能破其癖而下其水但須行血藥品佐助之必收十全之功其有純熱發瘧或蘊熱內實之證投以常山大便點滴而下似泄不泄者須用北大黃為佐泄利數行然後獲愈也又待制李燾云嶺南瘴氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉之間欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可但性吐人惟以七寶散冷服之即不吐且驗也

附方

舊三新二十三

截瘧諸湯

外臺秘要用常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升欲發

前頓服取吐 肘后方用常山一兩秫米一百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服盡 養生

主論王隱者聖瘡湯云予用此四十年奇效不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮晒乾知母貝母

草果各一錢半水一鍾半煎半截瘡諸酒

肘后方用常山一兩

酒一升漬二三日分作三服平旦一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服之

宋俠經心錄醇醪湯治

間日瘡支太醫云乃桂廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃二錢半炙甘草一錢二分水一盞半煎減半

醇發日五更溫服再以水一盞煎減半曰醪未發時溫服

虞搏醫學正傳治久瘡不止常山一錢半槓

柳一錢丁香五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之一服便止永不發如神

截瘡諸九

千金方恒山九治數年不瘥者兩劑瘥一月以來者一劑瘥恒山三兩研末雞子白和九梧子大瓦器煮

熟穀腥氣則取晒乾收之每服二十九竹葉湯下五更一服天明一服發前一服或吐或否即止

肘后



<p>丹砂九恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵百下</p> <p>丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時服三九</p> <p>酒下無不斷者 曾世榮活幼心書黃丹丸治大小</p> <p>久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦焙一兩為末</p> <p>糯米粉糊丸梧子大每服三五十九涼酒下隔一夜</p> <p>一服平旦一服午後方食 葛洪肘後方用恒山三</p> <p>兩知母一兩甘草半兩搗末蜜九梧子大先發時服</p> <p>十九次服七九後服五六九以瘥為度 和劑局方</p> <p>瞻仰九治一切瘧常山四兩炒存性草果二兩炒存</p> <p>性為末薄糊丸梧子大每卧時冷酒服五十九五更</p> <p>再服忌食羊熱物 又勝金九治一切瘧胸膈停痰</p> <p>發不愈者常山八兩酒浸蒸焙槓榔二兩生研末糊</p> <p>丸梧子大如上法服 集簡方二聖丸治諸瘧不拘</p> <p>遠近大小雞骨恒山雞心槓榔各一兩生研鯪鯉甲</p> <p>煨焦一兩半為末糯米粉糊丸九菴豆大 厥陰肝瘧</p> <p>黃丹為衣每服三五十九如上法服 熱少</p>
---

喘息如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄如神恒山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水

一盞煎半盞五更冷服趙真人濟急方**太陰肺瘧**瘧聚胸中病至令人

善驚如有所見恒山三錢甘草半錢秫米三十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服千金方少

**陰腎瘧**連凄然手足寒腰痛脊痛大便難目眴眴然恒山二錢半豉半兩烏梅一錢竹葉一錢半

蔥白三根水一升半煎一牝瘧獨寒不熱者蜀漆散升發前分三服千金方用蜀漆雲母煨

三日夜龍骨各二錢為末每服半錢臨發日旦一服發前一服酢漿水調下溫瘧又加蜀漆一錢張仲

景金匱**牡瘧獨熱**不冷者蜀漆一錢半甘草一錢麻要畧黃二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎

麻黃蜀漆去沫入藥再煎至一鍾未發**溫瘧熱多**山恒

前溫服得吐則止王璉外臺秘要

一錢小麥三錢茯苓二錢三十年瘡肘后方治三

水煎五更服甚良

藥性論

三十年瘡

十年老瘡及

積年久瘡常山黃連各一兩酒三升漬一宿以瓦釜

煮取一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當

利無不瘥者

張文仲備急方用恒山一兩半龍骨

五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和九梧

子大末發時五九將發時五九白湯

下走太醫云此方神驗無不斷者

瘡瘡寒熱

驗方常山一寸草果一枚熱酒一盞浸一夜五更望

東服之蓋卧酒醒即愈

說坐翁試驗方用常山檳

榔甘草各二錢黑豆一百粒水煎服之乃彭司寇所

傳 葛雅川肘后方用常山黃連香豉各一兩附子

炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹飲

服四九欲發時三九至午後乃食

妊娠瘡疾

酒蒸常

瘡各一錢烏梅炒五分甘草四分水一盞酒

一盞浸一夜平旦溫服

姚僧坦集驗方

百日兒

瘧

水鑑仙人歌曰瘧是邪風寒熱攻直須街治免成空常山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮如金生人

金生在巳即釘巳上木生人釘亥上小兒驚忤暴驚

火生人釘寅上水土生人釘申上也

卒死

中惡用蜀漆炒二錢左顧牡蠣一錢二分胸中痰飲

漿水煎服當吐痰而愈名千金湯

阮氏

恒山甘草各一兩水五升煮取一升去滓入蜜二合溫服七合取吐不吐更服千金方

附錄杜堇山

國經頃曰葉味苦寒主溫瘴寒熱作止不定煩渴頭痛心躁杵爛新酒浸絞汁

服吐出血涎甚效生宜用堇高四五尺葉似土紅山

苦蕒菜秋有花冬作實如枸杞子大而白

土紅山

頃曰葉甘微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘴瘧生南恩

州山野中大者高七八尺葉似枇杷而小無毛秋生

白花如粟粒不實福州生者作細藤似笑蕊葉其葉上青下白根如葛頭土人取根米泔浸一宿以清水

再浸一宿炒黃為末每服一錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘵甚效時珍曰杜莖山即土恒山土紅山又杜莖山之類故並附之

藜蘆

本經下品

釋名山葱

別錄

葱苒

同

葱莢

音毯

葱葵

普

豐蘆

普

慙葱

綱目

鹿葱

時珍曰黑色曰藜其蘆有黑皮裹之故名根際似葱俗名葱管藜蘆是矣北人謂之慙葱南人

謂之鹿葱

集解

別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾普曰大葉小根相連弘景曰近道處處有之根下極

似葱而多毛用之止剔取根微炙之徐昇曰所在山谷皆有葉似鬱金秦光蓂荷等根若龍膽莖下多毛

夏生冬凋八月采根頌曰今陝西山南東西州郡皆有之遼州均州解州者尤佳三月生苗葉似初出棧心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裏莖似椶皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾此有二種一種水蓼蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名蔥白蓼蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼為鹿蔥范子計然云出河東黃白者善

根修治

雷曰凡采得去頭用糯米泔汁煮之從已至未晒乾用

氣味辛寒有毒

別錄曰苦微寒普曰神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒李當之大寒大毒偏

鵠苦有毒之才曰黃連為之使反細辛芍藥人參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏蔥白服之吐不

止飲葱  
湯即止

主治蠱毒欬逆洩痢腸辟頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒

去死肌

本經

療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不

入湯用

別錄

主上氣去積年膿血泄痢

權

吐上膈風涎

暗風癰病小兒鰕齁痰疾

頌

末治馬疥癬

宗真

發明

頌曰黎蘆服錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嚏而別本云治噦逆甚效未詳時珍曰噦逆

用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不一常山吐蘆根瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事親云一婦病風癰自六七年得驚風後每一二年一作至五七年

五七作三十歲至四十歲則日作或甚至一日十餘  
作遂昏癡健忘求死而已值歲大饑采百草食于野  
中見草若葱狀采歸蒸熟飽食至五更忽覺心中不  
安吐涎如膠連日不止約一二斗汗出如洗甚昏困  
三日後遂輕健病去食進百脈皆和以所食葱訪人  
乃慙葱苗也即本草藜蘆是矣圖經言能吐風病此  
亦偶得吐法耳我朝荆和王妃劉氏年七十病中風  
不省人事牙關緊閉羣醫束手先考太醫吏目月池  
翁診視藥不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎  
藜蘆湯灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調理而安  
藥弗瞑眩厥疾弗瘳誠然

附方

舊六新  
十三

諸風痰飲

藜蘆十分鬱金一分為末每  
以一字溫漿水一盞和服探

吐經  
驗方

中風不省

牙關緊急者藜蘆一兩去苗頭濃  
煎防風湯浴過焙乾切炒微褐色



為末每服半錢小兒減半溫水調灌以中風不語喉

吐風涎為効未吐再服簡要濟衆

如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天南星一個去浮皮于臍上剉一坑納入陳醋二椀斗四面火過黃色研

為末生麴丸小豆大每服諸風頭痛和州藜蘆一莖三丸溫酒下經驗方

香少許吹鼻又方通頂散藜久瘡痰多不食欲吐蘆半兩黃連三分噉鼻聖惠

末半錢溫蘆水調痰瘡積瘡藜蘆皂莢炙各一兩巴下探吐保命集

蜜丸小豆大每空心服一丸未發時一黃疸腫疾藜丸臨發時又服一丸勿用飲食時後

灰中炮為末水服半錢胸中結聚如駭駭不去者巴七小吐不過數服效

搗如泥藜蘆炙研一兩蜜和搗身面黑痣藜蘆灰五九麻子大每吞一二丸肘后

碗淋汁銅器重湯煮成黑膏以針鼻中息肉紫蘆三分雄黃

一分為末蜜和點之每日三聖濟方牙齒蟲痛紫蘆末內入孔中勿吞汁

神效千金翼白禿蟲瘡紫蘆末猪脂調頭生蟻虱紫蘆末搽之

直頭風白屑痒甚紫蘆末沐頭搽之緊包反花惡瘡

惡肉反出如米紫蘆末猪脂疥癬蟲瘡紫蘆末生油和塗羊

疽瘡痒紫蘆二分附子八分為末傳誤吞水蛭紫蘆炒為

末水服一錢必吐

附錄山慈石別錄有名未用曰苦平無毒主女子帶下生山之陽正月生葉如紫蘆莖有衣

一名  
愛此  
參果根

又曰苦有毒主鼠癭生百餘根根有衣裏莖三月三日采根一名百連一名烏

一名  
一名鼠莖  
一名鹿蒲

馬腸根

宋圖經頌曰苦辛寒有毒主蠱除風葉療瘡疥生秦州葉似桑

三月采葉五  
月六月采根

木藜蘆

拾遺

釋名黃藜蘆

綱目  
鹿驪

集解

藏器曰陶弘景注漏蘆云一名鹿驪山南人用苗北人用根按鹿驪乃木藜蘆非漏蘆也乃樹

生如茱萸樹高二尺有毒時珍曰鹿驪俚人呼為黃藜蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文四月開細

黃花五月結小  
長子如小豆大

氣味苦辛溫有毒主治疥癬殺蟲

器藏

附子

本經  
下品

釋名其母名曰烏頭

時珍曰初種為烏頭象烏之頭也附烏頭而生者為附子如子

附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也別有草烏頭白附子故俗呼此為黑附子川烏頭以別之諸家不分烏頭有川草兩種皆混雜註解今悉正之

集解

別錄曰附子生犍為山谷及廣漢冬月采為附子春月采為烏頭弘景曰烏頭與附子同根附

子八月采八角者良烏頭四月采春時莖初生有腦頭如烏鳥之頭故謂之烏頭有兩歧其蒂狀如牛角者名烏喙取汁煎為射朮天雄似附子細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並是同根而木經

附子出捷為天雄出少室烏頭出朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用大明曰天雄大而長少角刺而實附子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次于附子側子小于烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之類氣力乃有殊等即宿根與嫩者爾數曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底陷黑如烏鐵天雄身全矮無尖周圍四面有附子孕十一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者木鼈子是喙附烏雄側中吐患者不入藥用保昇曰正者為烏頭兩歧者為烏喙細長三四寸者為天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾宗爽曰五者皆一物但依大小長短以象而名之爾頌曰

五者今並出蜀土都是一種所產其種出于龍州冬  
至前先將陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐  
月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺莖作四  
稜葉如艾其花紫碧色作穗其實細小如桑椹狀黑  
色本只種附子一物至成熟後乃有四物以長二三  
寸者為天雄割附子旁尖角為側子附子之絕小  
者亦名側子元種者為烏頭其餘大小者皆為附子  
以八角者為上綿州彰明縣多種之惟赤水一鄉者  
最佳然收采時月與本草不同謹按本草冬采為附  
子春采為烏頭博物志言附子烏頭天雄一物也春  
秋冬夏采之各異而廣志云奚毒附子也一歲為側  
子二年為烏喙三年為附子四年為烏頭五年為天  
雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔之法用力  
倍至故爾繁盛乎時珍曰烏頭有兩種出彰明者即  
附子之母今人謂之川烏頭是也春末生子故曰春  
采為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄

鳥喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及獨  
頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃本經  
所列鳥頭今人謂之草鳥頭者是也故曰其汁煎為  
射蔞陶弘景不知鳥頭有二以附子之鳥頭註射蔞  
之鳥頭遂致諸家疑貳而雷斅之說尤不近理宋人  
楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀之可不辯而明  
矣其說云綿州乃故廣漢地領縣八惟彰明出附子  
彰明領鄉二十惟赤水蘄水昌明會昌四鄉產附子  
而赤水為多每歲以上田熟耕作壟取種於龍安龍  
州齊歸木門青地小坪諸處十一月播種春月生苗  
其莖類野艾而澤其葉類地麻而厚其花紫瓣黃蕊  
長苞而圓七月采者謂之早水拳縮而小蓋未長成  
也九月采者乃佳其品凡七本同而末異其初種之  
小者為鳥頭附鳥頭而旁生者為附子又左右附而  
偶生者為鬲子附而長者為天雄附而尖者為天錐  
附而上出者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡

連貫如子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者為下天雄烏頭天雄皆以豐實盈握者為勝漏藍側子則因人以乞役夫不足數也謹按此記所載漏藍即雷敦所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其鬲子即烏喙也天雄即天雄之類醫方亦無此名功用當相同爾

**修治** 保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生熟湯浸半日勿令減氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法頌曰五物收時一處造釀其法先於六月內造大小麴麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候熟去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根鬚於新甕內淹



七日日攪一遍撈出以疎篩攤之令生白衣乃向慢  
風日中晒之百十日以透乾為度若猛日則皺而皮  
不附肉時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或  
種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已  
曝而孳若有神物陰為之者故園人常禱於神目為  
藥妖其釀法用醋醅安密室中淹覆彌月乃發出釀  
乾方出釀時其大有如拳者已定輒不盈握故及一  
兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌  
者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人纔市其下者閩浙  
纔得其中者其上品則皆貴人得之矣弘景曰凡用  
附子烏頭天雄皆熟灰微炮令析勿過焦惟薑附湯  
生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正  
制其毒故也敎曰凡使烏頭宜文武火中炮令皺折  
擊破用若用附子須底平有九角如鐵色一個重一  
兩者即是氣全勿用雖木火只以柳木灰火中炮令  
皺折以刀刮去上孕子并去底火擊破於屋下午地

上掘一土坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去  
皮夾底薄切以東流水并黑豆浸五日夜漉出日中  
晒用震亨曰凡烏附天雄須用童子小便浸透煮過  
以殺其毒并助下行之力入鹽少許尤好或以小便  
浸二七日揀去壞者以竹刀每個切作四片并水淘  
淨逐日換水再浸七日晒乾用時珍曰附子生用則  
發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入  
藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熱切片再  
炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一個用甘草二  
錢鹽水蘆汁重尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之  
則毒去也

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱昔曰神農辛岐伯  
雷公甘有毒李當之苦大溫有大

毒元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰  
浮中沈無所不至為諸經引用之藥好古曰入手少

陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑止而不  
行趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補仲景麻黃附子  
細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有  
發仲景乾薑附子湯通脉四逆湯是也戴原禮曰附  
子無乾薑不熟得甘草則性緩得桂則補命門李杲  
曰附子得生薑則能發散以熱攻熱又導虛熱下行  
以除冷病之才曰地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆  
甘草人參黃耆時珍曰畏綠豆烏韭童溲犀角忌敗  
汁得蜀椒食鹽下建命門

主治風寒欬逆邪氣寒濕踈躄拘攣膝

痛不能行步破癥堅積聚血瘕金瘡

本經

腰脊風寒脚

氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中強陰

堅肌骨又墮胎為百藥長

別錄

溫暖脾胃除脾濕腎寒

補下焦之陽虛

元素

除臟腑沈寒三陽厥逆濕淫腹痛

胃寒虯動治經閉補虛散壅

李呆

督脈為病脊強而厥

好古治三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痙

癰瘤小兒慢驚風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛

暴瀉脫陽久痢脾泄寒瘡瘴氣久病嘔噦反胃噎膈

癰疽不斂久漏冷瘡合葱涕塞耳治聾

時珍

烏頭

即附子母

主治諸風風痺血痺半身不遂除寒冷溫

養臟腑去心下堅痞感寒腹痛

元素

除寒濕行經散風

邪破諸積冷毒

李杲

補命門不足肝風虛

好古

助陽退陰

功同附子而稍緩

時珍

發明

宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄大畧如此其烏頭烏喙附子則量其材而用之時

珍曰按王氏究原方云附子性重滯溫脾逐寒川烏頭性輕疎溫脾去風若是寒疾即用附子風疾即用川烏頭一云凡人中風不可先用風藥及烏頭若先用氣藥後用烏頭乃宜也又凡用烏頭藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以熱則拒格而不納熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近效方治喉痺用蜜炙附子含之熨汁朱丹溪治疝氣用烏頭梔子並熱因寒用也李東

垣治馮翰林姪陰盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲  
脈來七八至但按之則散用蘆附湯加人參投半斤  
服之得汗而愈此則神聖之妙也吳綬曰附子乃陰  
證要藥凡傷寒傳變三陰及中寒夾陰雖身大熱而  
脈沈者必用之或厥冷腹痛脈沈細甚則唇青囊縮  
者急須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世  
陰證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而  
用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頓衰必須  
急用人參健脈以益其原佐以附子溫經散寒捨此  
不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多用烏附  
其氣暴能衝開道路故氣愈麻及藥氣盡而正氣行  
則麻病愈矣張元素曰附子以白朮為佐乃除寒濕  
之聖藥濕藥宜少加之引經又益火之原以消陰弱  
則便溺有節烏附是也虞搏曰附子秉雄壯之質有  
斬關奪將之氣能引補氣藥行十二經以追復散失  
之元陽引補血藥入血分以滋養不足之真陰引發

散藥開腠理以驅逐在表之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕震亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多濕亦宜少加烏附行經仲景八味丸用為少陰嚮導後世因以附子為補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下之性以行地黃之滯可致達爾烏頭天雄皆氣壯形偉可為下部藥之佐無人表其害人之禍相習用為治風之藥及補藥故人多矣王履曰仲景八味九兼陰火不足者設錢仲陽六味地黃丸為陰虛者設附子乃補陽之藥非為行滯也好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可僭用服附子以補火必妨酒水時珍曰烏附毒藥非危病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服錢七即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今運氣不同耶荆府都昌王體瘦而冷無他病日以附子煎湯飲康爵疏黃如此數歲新州衛張百戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張杲醫說載趙知府耽

酒色每日煎乾薑熟附湯吞硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟賦之偏服之有益無害不可以常理聚論也又瑣碎錄言滑臺風土極寒民啖附子如啖芋栗此則地氣使然爾

附方

舊二十六  
新八十七

少陰傷寒

初得二三日脈微細但欲寐小便色白者麻黃附子

甘草湯微發其汁麻黃去節二兩甘草炙二兩附子炮去皮一枚水七升先煎麻黃去沫納二味煮取三升分作三服取微汗  
張仲景傷寒論  
少陰發熱少陰病始得反發熱

辛湯發其汗麻黃去節二兩附子炮去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫乃納二味同煮三升分三服  
少陰下利  
少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人



面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通  
脈四逆湯用大附子一個去皮生破八片甘草炙二  
兩乾薑三兩水三升煮一升分溫再服其脈即出者  
愈而赤加蔥九莖腹痛加芍藥二兩嘔加生薑二兩  
咽痛加桔梗一兩利止脈陰病惡寒傷寒已發汗不  
不出加人參二兩同上解反惡寒者虛

也芍藥甘草附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附  
子炮去皮一枚水五升煮取一升五合分服同上

### 傷寒發躁

傷寒下後又發其汗晝日煩燥不得眠夜  
不安靜不嘔不渴無表證脈沈微身無大

熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚去  
皮破作八片水三升煮取一升頓服傷寒論陰

### 盛格陽

傷寒陰盛格陽其人必躁熱而不飲水脈沈  
手足逆冷者以此證也霹靂散用大附子一

枚燒存性為末蜜水調服過散寒氣然熱病吐下  
後熱一氣上行而汗出乃愈孫兆口訣熱病吐下及

利身冷脈微發躁不止者附子炮一枚去皮臍分作八片入鹽一錢水一升煎半升溫服立效經驗良

方陰毒傷寒

孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足厥逆脈息沈細或作呃逆並

宜退陰散用川烏頭乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服得汗解本事

方王女散治陰毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日切晒紙裏收之遇有患者取為末一錢

入鹽八分水一盞煎八分服壓下陰毒如猪血相似再進一服濟生回陽散治陰毒傷寒面青四肢厥

逆腹痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮臍為末每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如

火暖為度續傳信方治陰毒傷寒煩燥迷悶急者用半兩重附子一個生破作四片生薑一大塊作三

片糯米一撮以水一升煎六合溫服煖卧或汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得與冷水如

渴更煎滓服  
屢用多效  
**中風痰厥**  
昏不知人口眼喎斜并體虛

用生川烏頭生附子並去皮臍各半兩生南星一兩  
生木香二錢五分每服五錢生薑十片水二盞煎一

盞溫服  
和劑局方  
**中風氣厥**  
痰壅昏不知人六脉沈伏生附

兩每服四錢薑九片水二盞  
煎七分溫服之  
濟生方  
**中風偏廢**  
附子一箇去

皮臍羌活烏藥各一兩每服  
三片水一盞煎七分服  
王氏  
四錢生薑  
半身不遂  
逆

癖症用附子一兩以無灰酒  
一七日隔日飲一合  
延年  
秘錄  
風病癱緩  
手足

口眼喎斜語音蹇澀步履不正  
川烏頭去皮臍五靈脂各五兩  
為末入龍腦麝香五

分滴水為丸如彈子大每服一  
暖酒調服一日二服至五七  
九  
便覺手攢移得步十

丸可以梳頭  
也梅師方

風寒濕痺

麻木  
烏頭末

不

仁或手足不遂生川  
每以香白米煮粥一

益入末四錢慢熬得所下薑汁  
啖之或入薏苡末二錢左傳

云

一匙蜜三大匙空腹  
風淫末病謂四末也

脾主四肢風淫客肝則侵脾  
湯極有力子每授人良驗

許而

四肢病也此  
學士本事方體虛有

風外受寒濕身如在空中生  
生薑十片水一盞半慢火煎

附子

子生天南星各二錢  
服子曾病此醫傳張

子發授此方二

口眼喎斜

每生

烏

頭青礬各等分爲末  
用一字嚙入鼻內取涕

吐涎立效無比名通  
關散 篋中秘寶方

口卒噤瘡

卒忤停尸並用附子  
末吹入喉中瘡千

金產後中風

身如角弓反張  
到塊黑大豆半升

升

同炒半黑以酒三升  
燉不語川烏頭五兩

傾鍋內急攪以絹濾取酒微溫  
不開拘攣之未效加烏雞

升

服一小盞取汗若口  
一合炒納酒中服以

瘰癧為度

小品 諸風血風 烏荊主治諸風縱緩言語蹇澇偏

痛目眩腸風臟毒下血不止者服之尤效有痛風寧

搖願領不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去皮臍

一兩荊芥穗二兩為末醋麪糊丸梧子婦人血風虛

大溫酒或熱水每服二十九和劑方

月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮腫頑麻用川烏

頭一介清油四兩鹽四兩鐺內同熬令裂如桑椹色

為度去皮臍五靈脂四兩為末搗勻蒸餅丸如梧子

大空心溫酒鹽湯下二十九亦治丈夫風疾梅師

方 諸風癰疾 生川烏頭去皮二錢半五靈脂半兩為

末猪心血丸梧子大每薑湯化服一九

小兒慢驚 搗橘涎壅厥逆川烏頭生去皮臍一兩全

小兒項軟 乃肝腎虛風邪襲入用附子去

皮臍天南星各二錢為末薑汁

服 湯氏 小兒項軟 乃肝腎虛風邪襲入用附子去

嬰孩寶鑑 小兒項軟 乃肝腎虛風邪襲入用附子去

調攤貼天柱骨內服  
瀉青丸全幼心鑑  
小兒顛陷綿烏頭附子並生去

為末葱根搗和作餅  
貼陷處全幼心鑑  
麻痺疼痛仙桃丸治手足麻痺

痛或打撲傷損閃肭痛不可忍生川烏不去皮五靈  
脂各四兩威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每

服七九至十九鹽湯下忌茶此  
藥常服其效如神  
風痺肢痛川營衛不行

去皮以大豆同炒至汗出為度去豆焙乾全蠍半錢  
焙為末醎醋熬稠丸綠豆大每溫酒下七九日一服

聖方  
腰脚冷痺疼痛有風川烏頭三箇生去皮臍為  
散醋調塗帛上貼之須臾痛止聖

惠方  
大風諸痺痰癖脹滿大附子半兩者二枚炮折酒  
清之春冬五日夏秋三日每服一合以

瘥為度  
聖惠方  
脚氣腿腫臍為散生薑汁調如膏塗之藥

乾再塗腫消為  
度簡要濟眾  
**十脂疼痛**  
麻木不仁生附子去皮臍

煎溫服  
氏簡易方  
王  
**搜風順氣**  
烏附丸用川烏頭二十箇香

為末酒糊丸梧子大每溫酒下十九肌  
體肥壯有風疾者宜常服之  
澹寮方  
**頭風頭痛**  
外

秘要用臘月烏頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三  
斗酒中逐日溫服  
孫兆口訣用附子炮石膏煨等

分為末入腦麝少許每服半錢茶酒任下  
修真秘  
旨用附子一枚生去皮臍綠豆一合同入銚子內煮

豈熟為度去附子食綠豆立瘥  
每箇可煮五次後為末服之  
**風毒頭痛**  
聖惠方治

頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑一  
兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末一錢

溫服  
又方治二三十年頭風不愈者用大川烏頭  
生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二錢細茶三

錢薄荷七葉鹽梅一箇水一盞煎七分臨卧溫服  
朱氏集驗方治頭痛連睛者生烏頭一錢白芷四錢

為末茶服一字仍以末  
風寒頭痛  
客于頭中清涕項

筋急硬胸中寒痰嘔吐清水用大附子或大川烏頭  
二枚去皮熬過川芎藭生薑各一兩焙研以茶湯調

服一錢或到片每用五錢水煎服隔三四日一服或  
加防風一兩  
三因方必效散治風寒流注偏正頭

痛年久不愈最有神效  
用大附子一箇生切四片以  
薑汁一盞浸炙再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為

末每服一錢臘茶清  
頭風摩散  
沐頭中風多汗惡風  
調下忌熱物少時  
當先風一日則痛甚

用大附子一箇炮食鹽等分為末以方寸匕摩顙上  
令藥力行或以油調稀亦可一日三上  
張仲景方

年久頭痛  
川烏頭天南星等分為末  
頭風斧劈  
難忍  
葱汁調塗太陽穴  
經驗  
川烏



頭末燒烟熏碗內溫痰厥頭痛如破厥氣上衝痰塞  
茶炮服之集簡方

墨四錢冷水調服方寸七腎厥頭痛指南方用大附  
當吐即愈忌猪肉冷水

皮生薑半兩水一升半煎分三服經驗良方韭根  
九治元陽虛頭痛如破眼瞤如錐刺大川烏頭去皮

微炮全蠍以糯米炒過去米等分為末韭根氣虛頭  
汁丸綠豆大每薄荷茶下十五九一日一服

痛氣虛上壅偏正頭痛不可忍者大附子一枚去皮  
臍研末葱汁麪糊丸綠豆大每服十九茶清下

僧繼洪澹寮方蠍附丸云氣虛頭痛惟此方最合造  
化之妙附子助陽扶虛鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽

透葱涎取其通氣湯使用椒以達下鹽以引用使虛  
氣下歸對證用之無不作效大附子一枚剉心入全

蠍去毒三枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麪  
少許水和作劑已附煨熟去皮研末葱涎和丸梧子

大每椒鹽湯 腎氣上攻 頭項不能轉移椒附丸用大下五十九 熟附子一枚為末每用二錢

以椒二十粒用白麴填滿椒口水一盞半薑七片煎七分去椒入鹽空心點服椒氣下達以引逆氣歸經

也 本 鼻淵腦泄 生附子末葱涎和如耳鳴不止 無事方 泥膏酒泉穴 善濟

夜者烏頭燒作灰薑酒等分為末綿耳卒聾閉 附子裏塞之日再用取效 楊氏產乳 醋浸

剉尖棒之或更於上炙 聾耳膿血 生附子為末葱涕二七壯 本草拾遺 和灌耳中 肘後

喉痺腫塞 附子去皮炮令拆以蜜塗上炙之令蜜入含之勿熱汁已成者即膿出未成者即消

出 本 久患口瘡 生附子為末醋麴調貼足心風蟲草拾遺 男左女右日再換之 經驗

牙痛 善濟方用附子一兩燒灰枯礬一分為末搯之又方川烏頭川附子生研麴糊丸小豆大每

綿包一九咬之 劑繁方 眼暴赤腫 出不得開淚

用炮附子末納孔中乃止 赤皮末如蠶砂大著皆中以一切冷氣 去風痰定逾

定為度 張文仲備急方 氣強力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升大

甕鉢子盛以童子小便浸七日逐日添令溢出揀去

壞者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸

之日日換水日足取焙為末酒煮麴糊九綠豆大每

服十九空 心鹽湯下少 升降諸氣 暖則宣流熱附子

粥飯壓之 經驗方 水二盞煎一盞入沈香 中寒昏困 薑附湯治體虛中

汁溫服和劑局方 腹冷痛霍亂轉筋一切虛寒之病生附子一兩去皮

臍乾薑炮一兩每服三錢水二鍾煎一鍾溫服和

劑局 心腹冷痛 冷熱氣不和山梔子川烏頭等分生

方 研為末酒糊丸梧子大每服十五九

生薑湯下小腸氣痛加炒茴香心痛疝氣濕熱因寒  
葱酒下二十九王氏博濟方

梔子降濕熱烏頭破寒鬱烏頭為梔子所引其性急  
速不留胃中也川烏頭山梔子各一錢為末順流水

入薑汁一匙調寒厥心痛及小腸膀胱痛不可止者  
下丹溪纂要神砂一粒丹用熱附子去

皮髒金橘紅各一兩為末醋麴糊丸如酸漿大朱砂  
為衣每服一九男子酒下女人醋湯下宣明方

寒疝腹痛遺精手足厥冷白汗出脈弦而緊用大烏  
頭煎主之大烏頭五枚去臍水三升煮取

一升去滓納蜜二升煎令水氣盡強人服七合弱寒  
人服五合不瘥明日更服張仲景金匱玉函方

疝身痛腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭  
桂枝湯主之烏頭一味以蜜二斤煎減半八

桂枝湯五合解之得一升初服二合不知再服又不  
知加至五合其知者如醉狀得吐為中病也金匱

王寒疝引脇

脇心腹皆痛諸藥不效者大烏頭五枚去角四破以白蜜一斤煎令透取焙為

末別以熟蜜和九梧子大每服二十九冷鹽湯下永除

崔氏方

寒疝滑泄

腹痛腸鳴自汗

服逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑七片煎七分溫服濟生方

小腸諸疝

倉卒散治寒疝腹痛小腸氣膀胱氣脾腎諸痛學急難忍汗出厥逆大附子炒去皮

臍一枚山梔子炒焦四兩每用二錢水一盞酒半盞煎七分入鹽一捻溫服宣明方治陰疝小腹腫痛

加蒺藜子等分虛者加桂枝等分薑糊為丸溫酒服五十九

虛寒腰痛

鹿茸去毛酥炙微黃

附子炮去皮臍各二兩鹽花三分為末東肉和九梧子大每服三十九空溫酒下夷堅志云時康祖

大夫病心胃一漏數竅流汁已二十年又苦腰痛行則僂僂形神憔悴醫不能治迺判韓子溫為檢聖惠

方得此方令服旬餘腰痛減久服遂瘥心漏亦瘥  
精力倍常步履輕捷此方本治腰而效乃如此元

臟傷冷

經驗方用附子炮去皮臍為末以水二盞入  
藥二錢鹽蔥薑棗同煎取一盞空心服去積

冷暖下元肥腸益氣酒食無碍梅師方二虎丸補  
元臟進飲食壯筋骨用烏頭附子合四兩醃醋浸三

宿切作片子搥一小坑炭火燒赤以醋三升同藥傾  
入坑內用盆合之一宿取出去砂土入青鹽四兩同

炒赤黃色為末醋打麴糊丸如梧子  
大空心冷酒下十五丸婦人亦宜

胃冷有痰

脾弱嘔吐

生附子半夏各二錢薑十片水二盞煎七分空  
心溫服一方並炮熟加木香五分奇效良方久冷

反胃

經驗方用大附子一箇生薑一兩剉細同煮研  
如麴糊每米飲化服一錢衛生家寶方用薑

汁打糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十九  
斗門方用長大附子一箇坐于磚上四面著火漸逼

以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半碗  
乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘧或以猪  
腰子切片炙熟蘸食方便集用大附子一箇切下  
頭子剉一竅安丁香四十九箇在內仍合定線紮入  
砂銚內以薑汁浸過文火熬乾為末每挑  
少許置掌心紙喫日十數次忌毒物生冷**脾寒瘧疾**  
濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧寒多熱少  
或但寒不熱宜七朮湯主之用附子一枚炮七次鹽  
湯浸七次去皮臍分作二服水一碗生薑七片棗七  
枚煎七分露一宿發日空心溫服未久再進一服王  
璆百一選方云寒瘧宜附子風痰宜烏頭若用烏頭  
則寒多者火炮七次熱多者湯炮七次去皮焙乾如  
上法用烏頭性熱炮多則熱散也又梟附湯用熟  
附子去皮草果仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚  
煎七分發日早溫服肘后方**寒熱瘧疾**附子一枚  
臨發時以醋和附子塗于背上

麴煨人參丹砂各一錢為末煉蜜九梧子大每服二十丸未發前連進三服中病則吐或身體麻木未中

病來日再服  
**瘴瘧寒熱**  
冷瘴寒熱往來頭痛身疼  
麗安常傷寒論  
嘔痰或汗多引飲或自利

煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每以一片水一盞生薑十片煎七分溫服李侍制云此方極妙章

條云嶺南以啞瘴為危急不過一二日而死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得非以熱攻熱

而發散寒邪乎真起死回生之藥也嶺南衛生方  
**小便虛閉**  
兩尺脉沈微用利小水藥不效

者乃虛寒也附子一箇炮去皮臍鹽水浸良久澤瀉一兩每服四錢水一盞半燈心七莖煎服即愈普

濟  
**腫疾喘滿**  
大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小

便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水凝而不通惟服沈附湯則小便自



通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沈香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五枚

亦無害小兒每服三錢脾虛濕腫大附子五枚去皮水煎服朱氏集驗方四破以赤小豆半

升藏附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九粒蘿蔔湯下朱氏集驗方

陰水腫滿烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸九小豆大每

服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麵魚肉又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如

泥酒糊和丸小豆大每服三十粒大腸冷秘附子一枚九煎流氣飲送下普濟方炮去皮取

中心如棗大為末二錢蜜老人虛泄不寒熟附子一水空心服之聖濟總錄兩赤石脂一兩

為末醋糊丸梧子大末飲冷氣洞泄生川烏頭一兩下五十九丸楊氏家藏方木香半兩為末

醋糊丸梧子大每陳皮臟寒脾泄及老人中氣不足  
湯下二十九本方

二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥九梧子  
大每服八十九蓮肉煎湯下十便良方治脾胃虛

冷大腸滑泄米穀不化乏力用大附子十兩連皮同  
大衆二斤於石器內以水煮一日常令水過兩指取

出每箇切作三片再同煮半日削去皮切焙為末小  
別以麋肉和丸梧子大每空心米飲下三四十丸小

兒吐泄注下小便少白龍丸用熟附子五錢白石脂  
煨龍骨煨各二錢半為末醋糊丸黍米大

每米飲量兒大小霍亂吐泄不止附子重七錢者炮  
服全幼心鑑

水二盞鹽半錢煎一盞溫水泄久痢川烏頭二枚一  
服立止孫兆秘寶方

半合同煮熟研九絲豆大每久痢赤白獨聖丸用川  
服五九黃連湯下普濟方烏頭一箇灰

火燒烟盡取出地上盞蓋良久研末酒化蠟丸如大  
麻子大每服三九赤痢黃連甘草黑豆煎湯放冷吞  
下白痢甘草黑豆煎湯冷吞如瀉及肚痛以久痢休  
水吞下並空心服之忌熱物經驗良方

息熟附子半兩研末雞子白二枚搗和丸梧子大傾  
入沸湯煮數沸漉出作兩服米飲下聖濟總錄

下痢欬逆脈沈陰寒者退陰散主之陳自明云一人  
病此不止服此兩服而愈方見前陰毒傷

寒下血虛寒日久腸冷者熟附子去皮枳白朮一兩  
為末每服三錢米飲下又方熟附子

一枚去皮生薑三錢半水煎服陽虛吐血生地黃一  
或加黑豆一百粒並聖惠方

酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內石器  
煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和搗丸  
梧子大每空心米飲下三十九昔葛察判妻苦此疾  
百藥皆試得此而愈屢發屢效余居士選奇方

漫數白濁

熟附子為末每服二錢薑三片水一盞煎六分溫服

普濟方 虛火背熱

虛火上行背內熱如火灸者附經水不調 血臟冷痛 此方平易

捷徑熟附子去皮當歸等分 斷產下胎 生附子為末 每服三錢水煎服 普濟方

足心胎下去 折腕損傷 卓氏膏用大附子四枚生切 之 小品方 以猪脂一斤三年苦醋同漬

三宿取脂煎三上三下 癰疽腫毒 川烏頭炒黃藥炒 日摩傳之 深師方 各一兩為末唾調

塗之留頭乾則以 癰疽久漏 瘡口冷膿水不絕內無 米泔潤之 同上 惡肉大附子以水浸透

切作大片厚三分安瘡口上以艾灸之隔數日一灸 灸至五七次仍服內托藥自然肌肉長滿研末作餅

子亦可 詐 癰疽胛肉 如眼不欲諸藥不治此法極 已外科心法 妙附子削如甚于大以唾粘

貼上用艾炷灸之附子焦復唾濕癰疽肉突烏頭五枚濃醋

再炙令熱氣徹內即瘥千金方三升漬三日洗之日夜丁瘡腫痛醋和附子末塗之

三四度古今錄驗久生疥癬川烏頭生切以水煎洗甚驗手足凍裂附子去皮為末以水麴調

塗之良聖惠足釘怪疾兩足心凸腫上生黑豆瘡硬

發寒顛惟思飲酒此是肝腎冷熱相吞用炮川烏頭末傳之內服夏氏奇疾方

烏頭附子尖主治為末茶服半錢吐風痰癰瘤時珍

發明時珍曰烏頭用尖亦取其銳氣直達病所爾無他義也保幼大全云小兒慢脾驚風四肢厥逆

用附子尖一箇硫黃末一大一箇蠟稍七箇為末薑汁麴丸黃米大每服十九米飲下亦治久瀉疝羸凡

用烏附不可執為性熱審其手足冷者輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒

附方

舊一新七

風厥癰瘤

凡中風痰厥癰瘤驚風痰涎上壅牙關緊急上視搐搦並宜碧

霞丹主之烏頭尖附子尖蠟稍各七十箇石綠研九度飛過十兩為末麴糊丸芡子大每用一九薄荷汁

半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰涎為妙小兒驚癇加白僵蠶等分和劑局方

臍風撮

口生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙麝香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以薄荷湯灌一字水

類木舌腫脹

川烏尖巴豆研細醋調塗刷集簡方

牙痛難忍

附子尖天雄尖

全蠍各七箇生研為末點之永類方

奔豚疝氣

作痛或陰囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七

箇巴豆七枚去皮油為末糲糊九梧子大朱砂麝香  
為衣每服二九空心冷酒或冷鹽湯下三兩日一服  
不可多

### 割甲成瘡

連年不愈川烏頭尖黃蘗等分  
為末洗了貼之以愈為度古


瘡瘻方

今錄  
驗

### 老幼口瘡

烏頭尖一箇天南星一箇研末薑汁  
和塗足心男左女右不過二三次即

愈



本草綱目卷十七上



欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十七下

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣陳大初

欽定四庫全書

本草綱目卷十七下

明 李時珍 撰

草之六

毒草類  
三十種

天雄

本經  
下品

釋名白幕

本經時珍曰天雄乃種附子而生出或變  
出其形長而不生子故曰天雄其長而尖

者謂之天

雄象形也

集解

劉銚曰天雄生少室山谷二月采根陰乾弘景  
曰今采用八月中旬天雄似附子細而長乃至

三四十寸許此與烏頭附子三種本出建平故謂之三  
建今宜都佷山者最好謂為西建錢塘間者謂為東  
建氣力小弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰  
殺之時有水强者不佳恭曰天雄附子烏頭並以蜀  
道綿州龍州出者佳餘處縱有力弱不相似陶以三  
物俱出建平故名之者非也烏頭苗名莖音斬爾雅  
云莖莖草是也今訛莖為建遂以建平譯之矣承曰  
天雄諸說悉備但始種而不生附子倒子經年獨長  
大者是也蜀人種之尤忌生此以為不利如養蠶而  
成白蠶之意時珍曰天雄有二種一種是蜀人種附  
子而生出長者或種附子而盡變成長者即如種芋  
形狀不一之類一種是他處草烏頭之類自生成者  
故別錄註烏喙云長三寸已上者為天雄是也入藥  
須用蜀產曾經釀制者或云須重二兩半有象眼者  
乃佳餘見  
附子下

修治

得 穀曰宜炮皴去皮尖底用或陰制如附子法亦

甚佳時珍曰熟用一法每十兩以酒浸七日掘土坑用炭半秤煨赤去火以醋二升沃之候乾乘熱入天雄在內小盆合一夜取出去臍用之

氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大溫權曰大熱宜乾薑制之才曰遠志為之使惡腐

婢忌  
豉汁

主治大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金

瘡強筋骨輕身健行

本經

療頭面風去來疼痛心腹結

聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇力作不倦

別錄禹錫曰按淮南子云天雄雄雞志氣益注云取天雄一枚納雄雞腸中搗

食之令人勇

治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽

蟲毒

甄權

治一切風一切氣助陽道暖水臟補腰膝益

精明目通九竅利皮膚調血脈四肢不遂下胸膈水

破瘡癰癰結排膿止痛續骨消痰血背脊偃僂霍亂

轉筋發汗止陰汗炮含治喉痺

大明

發明

宗奭曰補虛寒頤用附子風家多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取其數

散也元素曰非天雄不能補上焦之陽虛震亨曰天雄烏頭氣壯形偉可為下部之佐時珍曰烏附天雄

皆是補下焦命門陽虛之藥補下所以益上也若是  
上焦陽虛即屬心脾之分當用參芪不當用天雄也  
且烏附天雄之尖皆是向下生者其氣下行其臍乃  
向上生苗之處寇宗奭言其不肯就下張元素言其  
補上焦陽虛皆是誤認尖為上爾惟朱震亨以為下  
部之佐者得之而未發出此義雷斅炮炙論序云咳  
逆數數酒服熟雄謂以  
天雄炮研酒服一錢也

附方

新三

建湯

治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷大  
小便滑數小便便白渾六脈沉微除固

冷扶元氣及傷寒陰毒用烏頭附子天雄並炮裂去  
皮臍等分咬咀每服四錢水二盞薑十五片煎八分

溫服

肘後方

男子失精

天雄三兩炮白朮八兩桂枝六兩  
龍骨三兩為散每酒服半錢張

仲景金匱要畧

大風惡癩

三月四月米天雄烏頭苗及根去  
土勿洗搗汁漬細粒黑豆摩去皮

不落者一夜取出晒乾又浸如此七次初吞三枚漸加至六七枚禁房室猪魚雞蒜犯之即死

側子

別錄下品

釋名翦子

時珍曰生于附子之側故名許慎說文作翦子

集解

弘景曰此附子邊角之大者削取之昔時不用比來醫家以療腳氣多驗恭曰側子附子皆是

烏頭下旁出者以小者為側子大者為附子今以附子角為側子理必不然若當陽以下江左山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州以上劍南所出者附子之角但如黍粟豈可充用比來都下皆用細附子有效未嘗取角也保昇曰今附子邊果有角如大棗核及檳榔以來者形狀自是一顆且不小乃烏頭旁出附子附子旁出側子甚明時珍曰側子乃附子旁粘連小者爾故吳普陶弘景皆指為附子角

之大者其又小於側子者即漏藍子矣故楊氏  
附子記言側子漏藍園人皆不重之以乞役夫

修治

同附子

氣味辛大熱有大毒

晉曰神農岐伯有大毒八月采畏惡與附子同

主治癰

腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

別錄

療脚氣

冷風濕痺大風筋骨攣急

甄權

冷酒調服治遍身風癰

神妙

雷斅

發明

機曰烏頭乃原生之腦得母之氣守而不移居乎中者也側子散生旁側體無定在其氣輕揚

宜其發散四肢充達皮毛為治風之藥天雄長而尖其氣親上宜其補上焦之陽虛木蠶子則餘氣所結



其形惟殘宜其不入湯服令人喪目也時珍曰唐元希聲侍郎治癰瘡風有側子湯見外臺秘要藥多不錄

# 漏藍子

綱目

## 釋名木鼈子

炮炙論

## 虎掌

日華時珍曰此乃附子之項細未成者小而漏藍故名南

星之最小者名虎掌此物類之故亦同名大明會典載四川成都府歲貢天雄二十對附子五十對烏頭五十對漏藍二十斤不知何用

## 氣味苦辛有毒

救日服之令人喪目

主治惡痢冷漏瘡惡瘡癰

## 風

時珍

發明

時珍曰按楊士瀛直指方云凡漏瘡年久者復其元陽當用漏藍子輩加減用之如不當用而

輕用之又恐熱氣乘虛變移結核而為害尤甚也又按類編云一人兩足生瘡臭潰難近夜宿五夫人祠下夢神授方用漏藍子一枚生研為末入膩粉少許并水調塗依法治之果愈蓋此物不堪服餌止宜入瘡科也

附方

新一切惡痢 雜下及休息痢百歲丸用漏藍子一箇大者阿膠木香黃連罌粟殼

各半兩俱炒焦存性入乳香少許為末糊丸梧子大每一歲一丸米飲下 羅天益衛生寶鑑

烏頭

本經下品

校正

併入拾遺 獨白草

釋名烏喙

本經即頭尖

草烏頭

綱目

土附子

日華

奚毒

本經

耿子

吳毒公

吳普又

金鴉

綱目

苗茗茝

音茝

及董

音董

獨白草

拾遺 鴛鴦菊

綱目

汁煎名射罔

普曰鳥頭形如鳥之頭也 有兩歧相合如鳥之喙者

名曰鳥喙喙即鳥之口也恭曰鳥喙即鳥頭異名也此有三歧者然兩歧者少若鳥頭兩歧名鳥喙則天雄附子之兩歧者復何以名之時珍曰此即鳥頭之野生於他處者俗為之草鳥頭亦曰竹節鳥頭出江北者曰淮鳥頭日華子所謂土附子者是也鳥喙即偶生兩歧者今俗呼為兩頭尖因形而名其實乃一物也附子天雄之偶生兩歧者亦謂之鳥喙功亦同于天雄非此鳥頭也蘇恭不知此義故反疑之草鳥頭取汁晒為毒藥射禽獸故有射罔之稱後魏書言遼東塞外秋收鳥頭為毒藥射禽獸陳藏器所引續漢五行志言西國生獨白草煎為藥數箭射人即死者皆此鳥頭非川鳥頭也菊譜云鴛鴦菊即鳥喙苗

也

集解

別錄曰烏頭烏喙生朗陵山谷正月二月采陰乾長三寸以上者為天雄普曰正月始生葉厚

莖方中空葉四四相當與蒿相似弘景曰今采用四月亦以八月采搗芡莖汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸十步即倒中人亦死宜速解之朗陵屬汝南郡大明曰土附子生去皮搗濾汁澄清旋添晒乾取膏名為射罔以作毒箭時珍曰處處有之根苗花實並與川烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白皺而枯燥為異爾然毒則甚焉段成式酉陽雜俎言雀芋狀如雀頭置乾地反濕濕地反乾飛鳥觸之墮走獸遇之僵似亦草烏之類而毒更甚也又言建寧郡烏勾山有牧鹿草鳥鵲誤食烏喙中毒必急食此草以解之牧鹿不知何藥也

修治

時珍曰草烏頭或生用或炮用或以烏大豆同煮熟去其毒用

烏頭氣味辛溫有大毒

別錄曰甘大熱大毒普曰神農雷公桐君黃帝甘有毒權

曰苦辛大熱有大毒大明曰味蒸辛熱有毒之才曰莽草遠志為之使反半夏枯樓貝母白皴白芨惡藜蘆時珍曰伏丹砂砒石忌豉汁畏飴糖黑豆冷水能解其毒

主治中風惡風洗洗

出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之名

射罔殺禽獸

經本

消胸上痰冷食不下心腹冷痰臍間

痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎

別錄

主惡風憎

寒冷痰包心腸腹痛瘡癰氣塊齒痛益陽事強志

甄權 治頭風喉痺癰腫疔毒時珍

烏喙一名兩頭尖氣味辛微溫有大毒

普曰神農雷公桐君黃帝

有毒權曰苦辛大熱畏惡同烏頭

主治風濕丈夫腎濕陰寒癢寒熱

歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎別錄男子

腎氣衰弱陰汗瘰癧歲月不消

甄權主大風頑痺時珍

射罔氣味苦有大毒

之才曰溫大明曰人射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水

薺芫皆可一味禦之

主治尸疰癰堅及頭中風痺

別錄癰瘡瘡根

結核瘰癧毒腫及蛇咬先取塗肉四畔漸漸近瘡習

習逐病至骨瘡有熱膿及黃水塗之若無膿水有生

血及新傷破即不可塗立殺人

藏器

發明

時珍曰草烏頭射罔乃至毒之藥非若川烏頭附子人所栽種加以釀制殺其毒性之比自非

風頑急疾不可輕投甄權藥性論言其益陽事治男  
子腎氣衰弱者未可遽然也此類止能搜風勝濕開  
頑痰治頑瘡以毒攻毒而已豈有川烏頭附子補右  
腎命門之功哉吾斷却知府自負知醫因病風癱服  
草烏頭木鼈子藥過多甫入腹而麻痺遂至不救可  
不慎乎機曰烏喙形如鳥嘴其氣鋒銳宜其通經絡  
利關節尋蹊達徑而直抵病所煎為射罔能殺禽獸  
非氣之鋒銳捷利能如是乎楊清叟曰凡風寒濕痺  
骨內冷痛及損傷入骨年久發痛或一切陰疽腫毒  
並宜草烏頭南星等分少加肉桂為末薑汁熱酒調

塗未破者能內消久潰者能去黑爛二藥性味辛烈能破惡塊逐寒熱遇冷即消遇熱即潰

附方

舊四新四十八

陰毒傷寒

生草烏頭為末以蔥頭蘸藥納穀道中名提盆散 王海

藏陰證

二便不通

即上方名

中風癱瘓

手足顛掉言語蹇澀左經

畧例

丸用草烏頭炮去皮四兩川烏頭炮去皮二兩乳香沒藥各一兩為末生烏豆一升以斑蝥三七箇去頭翅同煮豆熟去發取豆焙乾為末和勻以醋麯糊丸梧子大每服三十丸溫酒下 簡易方 癱瘓

頑風

骨節疼痛下元虛冷諸風痔漏下血一切風瘡草烏頭川烏頭兩頭失各三錢硫黃麝香丁香

各一錢木鼈子五箇為末以熟蘆艾揉軟合成一處用鈔紙包裹燒熏病處名雷丸 孫天仁集效方

諸風不遂

宋氏集驗方用生草烏頭晚蠶沙等分為末取生地龍搗和入少醋糊丸梧子大每



服四五丸白湯下甚妙勿多服恐麻人名郭者小金  
丹經驗濟世方用草烏頭四兩去皮大豆半升鹽  
一兩同以沙瓶煮三伏時去豆將烏頭入木臼搗三  
百杵作餅焙乾為末酒糊丸梧子大每空心鹽湯下  
十九名一切頑風神應丹用生草烏頭生天麻各洗  
至寶丹一切頑風等分搗爛絞汁傾盆中砌一小坑  
其下燒火將盆放坑上每日用竹片攪一次夜則露  
之晒至成膏作成小錠子每一錠分作三服用蔥薑  
自然汁和好酒熱一切風證不問頭風痛風黃鶴吊  
服乾坤秘製一切風證脚風痺生淮烏頭一斤  
生川烏頭一枚生附子一枚並為末葱一斤薑一斤  
搗如泥和作餅子以草鋪盤內加楮葉於上安餅於  
葉上又鋪草葉蓋之待出汗黃一日夜乃晒之春為  
末以生薑取汁煮麴糊和丸梧子大初服三十九日  
二服服後身痺汗出即破傷風病為末每以一二分  
愈避風乾坤秘製

溫酒服之出汗 儒門事親方用草烏尖白芷并生  
研末每服半錢冷酒一盞入蔥白一根同煎服少頃

以蔥白熱粥投之汗出即愈

### 年久麻痺

或歷節走氣疼痛不仁不  
拘男女神授散用草烏頭

半斤去皮為末以袋一箇盛豆腐半袋入烏末在內  
再將豆腐填滿壓乾入鍋中煮一夜其藥即堅如石  
取出曬乾為末每服五分冷風濕氣以生薑  
湯下麻木不仁以蔥白湯下之 活人心統 風濕痺

### 木

黑神丸草烏頭連皮生研五靈脂等分為末六月  
六日滴水丸彈子大四十歲以下分六服病甚一

丸作二丸薄荷湯化下

### 風濕走痛

黑弩前丸用兩頭  
覺微麻為度 本事方

乳香沒藥當歸三錢為末醋糊丸梧子大每服十丸  
至三十九丸臨卧溫酒下忌油膩濕麪孕婦勿服 瑞

竹堂 腰痛

烏頭三箇去皮臍研末醋調  
貼須臾痛止 十便良方

### 膝風作

痛

草烏細辛防風等分為末搽靴襪中及遠行脚腫

草烏細辛防風等分為末搽鞋底內如草鞋經脚氣掣

痛

或勝間有核生草烏頭大黃木鱉子作末薑汁煎茶調貼之又法草烏一味為末以薑汁或酒糟

同搗貼之濕滯足腫

永類方 薑一兩同研交感一宿蒼朮一

兩以葱白一兩同研交感一宿各焙乾為末酒糊除

風去濕

治痺胃虛弱久積冷氣飲食減少用草烏頭一斤蒼朮二斤以去白陳皮半斤生甘草四

兩黑豆三升水一石同煮乾只揀烏朮晒焙為末酒

糊丸梧子大焙乾收之每空心溫酒下二三十丸覺

麻即漸減之名烏朮丸

集簡方

偏正頭風

草烏頭四兩川芎窮四兩蒼朮半斤生薑四兩

連鬚生蔥一把搗爛同入瓷瓶封固埋土中春五夏  
三秋五冬七日取出曬乾揀去蔥薑為末醋麪糊和  
丸梧子大每服九九臨卧溫久患頭風草烏頭尖生  
用一分赤小  
酒下立効  
戴古渝經驗方  
豆三十五粒磨香一字為末每服半錢  
薄荷湯冷服更隨左右嚙鼻指南方風痰頭痛虛體  
傷風停聚痰飲上厥頭痛或偏或正草烏頭炮去皮  
尖半兩兩川烏頭生去皮尖一兩藿香乳香三皂子大  
為末每服二錢薄荷薑湯血風證草烏頭  
厄子等分為末  
下食後服陳言三因湯  
自然蔥汁隨左右調塗太陽及腦洩臭穢草烏去皮  
半兩蒼朮  
額上勿過眼避風濟生方  
一兩川芎二兩並生研末麪糊丸綠豆大耳鳴耳癢  
每服十九茶下忌一切熱物聖濟總錄  
如流水及風聲不治成聾用生烏頭掘得乘濕削  
如棗核大塞之日易二次不三日愈千金方  
喉

痺口噤

不開欲死草烏頭皂莢等分為末入麝香少許擦牙并嚙鼻內牙關自開也 濟生方用

草烏尖石膽等分為末每用一錢醋煮皂莢汁調柿搗入腫上流涎數次其毒即破也 虛壅口

瘡

滿口連舌者草烏一箇南星一箇生薑一大塊為末睡時以醋調塗手心足心或以草烏頭吳茱萸

等分為末蜜調塗足心 本事方

疳蝕口鼻

穿透者草烏頭燒灰入麝香等分為末貼之

風蟲牙痛

草烏炒黑一兩細辛一錢為末指之吐出涎一方草烏食鹽同炒黑搽之 海上

方寒氣心疝

三十年者射罔食茱萸等分為末蜜丸麻子大每酒下二丸日三服劉國英所

秘之方 汪東陽方

寒瘧積瘧

巴豆一枚去心皮射罔去皮如巴豆大大棗去皮一枚搗

成丸梧子大清旦先發時每服一丸白湯下 肘後方

脾寒厥瘧

先寒後熱名寒瘧但寒不

熱而色黑者名厥瘡寒多熱少面黃腹痛名脾瘡三者並宜服此賈耘老用之二十年累試有效不蛀草烏頭削去皮沸湯泡二七度以蓋蓋良久切焙研稀糊丸梧子大每服三十丸薑十片棗三枚葱三根煎湯清早服以棗壓之如人行十里許再一服絕勿飲湯便不發也 蘇東坡良方 腹中癥結

害妨飲食羸瘦射罔二兩椒三百粒搗末雞子白和丸麻子大每服一丸漸至三丸以愈為度 肘後方

### 水泄寒痢

和丸 綠豆大每服七丸并華水下忌生冷

魚肉 十 泄痢注下 三神丸治清濁不分泄瀉注下

便良方

### 泄痢注下

或赤或白腹臍刺痛裏急後重

用草烏頭三箇去皮尖以一箇火炮一箇醋煮一箇燒灰為末醋糊丸綠豆大每服二十丸水瀉流水下

赤痢甘草湯下白痢薑湯下 結陰下血 腹痛草烏頭

忌魚腥生冷

和劑局方

### 結陰下血

蛤粉炒去皮

臍切一兩茴香炒三兩每用三錢水一盞入鹽少許煎八分去滓露一夜五更冷服聖濟錄老人

遺尿

炒為末酒糊丸綠豆大每服二十丸鹽湯下

普濟內痔不出

草烏為末津調點肛門內痔即反出乃用枯痔藥點之外科集驗方

毒初起

草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅麩一兩為末無根水調搽留口以紙蓋之乾則

以水潤之

唐瑤經驗方

疔毒惡腫次生烏頭切片醋熬成膏攤貼

兩巴豆四箇搗貼疔

自拔出普濟方

疔瘡發背草烏頭去皮為末用葱白連鬚和搗丸晚

豆大以雄黃為衣每服一丸先將葱一根細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之即卧

以被厚蓋汗出為度亦治頭風

乾坤秘韞

惡毒諸瘡及發背疔瘡便毒等證二烏膏用草

烏頭川烏頭于瓦上以升華水磨汁塗之如有口即塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之永類方

# 大風癬瘡

遍身黑色肌體麻木痺痛不常草烏頭一斤刮洗去皮搥淨攤乾以清油四兩鹽四

兩同入銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并藥再炒令黑烟出為度取一枚擘破心內如米一點白者

始好白多再炒乘熱杵羅為末醋麪糊丸梧子大每服三十丸空心溫酒下草烏性毒難制五七日間以

黑豆煮粥食解其毒繼洪澹黎方遍身生瘡陰囊兩脚尤甚者草烏

夜炒赤為末猪腰子一具去膜煨熟竹刀切搗醋糊丸綠豆大每服三十九空心鹽湯下澹黎方一

# 切諸瘡

未破者草烏頭為末入輕粉普濟方瘰癧初作未破少許臘猪油和搽

熱草烏頭半兩木鱉子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻傅上以紙條貼令通氣孔妙



醫林正宗 馬汗入瘡

腫痛急療之遲則毒深以生烏頭末  
傅瘡口良久有黃水出即愈 靈苑

方 蛇蝎螫人

射罔傳之頻易血  
出愈 梅師方

中沙虱毒

射罔傳之  
佳 千金

白附子

別錄  
下品

釋名

見後發  
明下

集解

別錄曰白附子生蜀郡三月采弘景曰此物又  
絕無復真者恭曰本出高麗今出涼州以西蜀

郡不復有生砂磧下濕地獨莖似鼠尾草細葉周匝  
生於地間根形似天雄均曰徐表南州異物記云生  
東海新羅國及遼東苗與附子相似時珍根  
正如草烏頭之小者長寸許乾者皺文有節

氣味辛甘大溫有小毒

係昇曰甘辛溫大明曰無毒  
均曰小毒入藥炮用果曰純

陽引藥  
勢上行

主治心痛血痺面上百病行藥勢

別錄

中風失

音一切冷風氣面肝癰疵

大明

諸風冷氣足弱無力疥

癬風瘡陰下濕癢頭面痕入面脂用

李珣

補肝風虛

好古

風痰

震亨

發明

時珍曰白附子乃陽明經藥因與附子相似故得此名實非附子類也按楚國先賢傳云孔休

傷頰有癰王莽賜玉屑  
白附子香與之消癰

附方

新十

中風口喎

半身不遂牽正散用白附子白蘞蠶全蝎並等分生研為末每

服二錢熱酒調下

楊氏家藏方

小兒暑風

暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證

非此丸生料瞑眩之劑不能伐之三生丸用白附子  
天南星半夏並去皮等分生研猪膽汁和丸黍米大  
量兒大小以薄荷湯下令兒側風痰眩運頭痛氣鬱  
卧嘔出痰水即愈全幼心鑑  
白附子炮去皮臍半斤石膏煨紅半斤硃砂二兩二  
錢半龍腦一錢為末粟米飯丸小豆大每服三十丸  
食後茶酒任下  
御藥院方 偏正頭風 白附子白芷猪牙皂角去  
皮等分為末食後茶清服

仰卧少頃 痰厥頭痛 白附子天南星半夏等分生  
普濟本事方 研為末生薑自然汁浸蒸餅

丸綠豆大每服四十丸 赤白汗斑 白附子硫黃等分  
食後薑湯下 濟生方 為末薑汁調柿茄

蒂蘸擦日數 面上肝黯 白附子為末卧時漿水洗面  
次簡便方 以白蜜和塗紙上貼之久久

白落 耳出膿水 白附子炮羌活一兩為末猪羊  
生易簡方 腎各一箇每箇入末半錢濕紙

包煨熟五更食溫酒下 聖濟錄

喉痺腫痛

白附子末枯礬等分研末塗舌上有涎吐出

聖惠方

偏墜疝氣

白附子一箇為末津調填臍上以艾灸三壯或五壯即愈 楊起簡便方

小兒吐逆

不定虛風喘急白附子藿香等分為末每米飲下半錢 保幼大全方

慢痺

驚風

白附子半兩天南星半兩黑附子一錢並炮去皮為末每服二錢生薑五片水煎服亦治大人

風虛止吐化痰宣和間真州李博士用治吳內翰女孫甚効康州陳侍郎病風虛極昏吳內翰令服三四

服即愈 楊氏家藏

虎掌

本經下品

天南星

宋開寶

釋名虎膏

綱目

鬼蒟蒻

日華恭曰其根四畔有圓牙看如虎掌故有此名頌曰天南星

即本草虎掌也。小者名由跋。古方多用虎掌。不言天南星。南星近出。唐人中風痰毒方中用之。乃後人採用。別立此名。爾時珍曰：虎掌因葉形似之，非根也。南星因根圓白，形如老人星狀，故名。南星即虎掌也。蘇恭說甚明。白宋開寶不當重出。南星條今併入。

集解

別錄曰：虎掌生漢中山谷及寬句。二月八月采。陰乾。弘景曰：近道亦有形似半夏，但大而四邊

有子如虎掌，今用多破作三四片。方藥不甚用也。恭曰：此是由跋宿根，其苗一莖莖頭一葉枝了扶莖根大者如拳，小者如雞卵，都似扁柿。四畔有圓牙，看如虎掌。由跋是新根，大如半夏。二三倍四畔無子牙。陶說似半夏，乃由跋也。保昇曰：莖頭有八九葉花生莖間，藏器曰：天南星生安東山谷，葉如荷，獨莖用根。頌曰：虎掌今河北州郡有之，初生根如豆，大漸長大似半夏，而扁。年久者根圓及寸大者如雞卵。周匝生圓。

牙三四枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有  
葉如爪五六出分布尖而圓一窠生七八莖時出一  
莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙裹莖作房旁開  
一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即  
白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根今冀州  
人菜園中種之呼為天南星又曰天南星處處平澤  
有之二月生苗似荷梗其莖高一尺以來葉如蒟蒻  
兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似  
石榴子紅色二月八月采根似芋而圓扁與蒟蒻相  
類人多誤采了不可辨但蒟蒻莖斑花紫南星根小  
柔膩肌細炮之易裂為可辨爾南星即本經虎掌也  
大者四邊皆有牙子采時削去之江州一種草葉大  
如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生三四葉為一本  
冬青不結花實治心疼寒熱積氣亦與虎掌同名故  
附見之時珍曰大者為虎掌南星小者為由跋乃一  
種也今俗又言大者為鬼臼小者為南星殊為謬誤

修治

頌曰九月采虎掌根去皮臍入器中湯浸五七日換三四遍洗去涎暴乾用或再火炮裂用

時珍曰凡天南星須用一兩以上者佳治風痰有生用者須以溫湯洗淨仍以白礬湯或入皂角汁浸三日夜日日換水暴乾用若熟用者須於黃土地掘一小坑深五六寸以炭火燒赤以好酒沃之安南星於內瓦盆覆定灰泥固濟一夜取出用急用即以濕紙包于煑灰火中炮裂也一法治風熱痰以酒浸一宿桑柴火蒸之常洒酒入甑內令氣猛一伏時取出竹刀切開味不麻舌為熟未熟再蒸至不麻乃止脾虛多痰則以生薑渣和黃泥包南星煨熟去泥焙用造南星麴法以薑汁礬湯和南星末作小餅子安籃內楮葉包蓋待上黃衣乃取晒收之造胆星法以南星生研末臘月取黃牯牛胆汁和劑納入胆中繫懸風處乾之年久者彌佳

氣味苦溫有大毒

別錄曰微寒。普曰虎掌神農雷公苦有毒。岐伯桐君辛有毒。大明曰

辛烈平。杲曰苦辛有毒。陰中之陽可升可降。乃肺經之本藥。震亨曰欲其下行以黃蘗引之。之才曰蜀漆。為之使惡莽草。大明曰畏附子。乾薑生薑時珍曰得防風則不麻。得牛胆則不燥。得火炮則不毒。生能伏

雄黃丹砂焰消

主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩

利水道

本經

除陰下濕風眩

別錄

主疝瘕腸痛傷寒時疾

強陰

甄權

天南星主中風麻痺除痰下氣利胃膈攻堅

積消癰腫散血墮胎

開寶

金瘡折傷瘀血搏傳之

藏蛇

蟲咬疥癬惡瘡

大明

去上焦痰及眩運

元素

主破傷風口



噤身強

李補肝風虛治痰功同半夏

好治破癰口眼

喝斜喉痺口舌瘡糜結核解頤

時珍

發明

時珍曰虎掌天南星乃手足太陰脾肺之藥味辛而麻故能治風散血氣溫而燥故能勝濕除

涎性燥而毒故能攻積拔腫而治口喝舌糜楊士瀛直指方云諸風口噤宜用南星更以人參石菖蒲佐之

附方

舊十新二十九

中風口噤

目瞤無門下藥者開闕散用天南星為末入白龍腦等分

五月五日午時合之每用中指點末指齒三二十諸

風口噤

天南星炮剉大人三錢小兒三字生薑五片蘇葉一錢水煎減半入雄猪膽汁少許溫服

仁齋

# 小兒口噤

牙關不開天南星一枚煨熟紙裹斜包剪一小孔透氣于口中牙關

自開也

一方用生南

# 小兒驚風

隆涎散用天南星一兩重一箇換酒

星同薑汁擦之自開

浸七伏時取出安新瓦上週迴炭火炙裂合濕地出火毒為末入硃砂一分每服半錢荊芥湯調下每日

空心一服午時

# 吐瀉慢驚

天王散治小兒吐瀉或誤服冷藥脾虛生風痰慢驚

一服經驗方

天南星一箇重八九錢者去臍黃土坑深三寸炭火

五斤煨赤入好酒半盞安南星在內仍架炭三條在

上候發裂取剉再炒熟為末用五錢天麻煨熟研末

一錢麝香一字和勻三歲小兒用半錢以生薑防風

煎湯調下亦治久嗽

# 風癇痰迷

隆痰丸用天南星九蒸九晒為末薑汁麵

惡心錢乙小兒方

糊丸梧子大每服二十九人參湯下小兒癇瘡瘡後石菖蒲麥門冬湯亦可衛生寶鑑

能言以天南星濕紙包煨為末雄猪膽汁調服二字全幼心鑑治癰利痰煨香一

兩硃砂一錢為末猪心五丸梧子口眼喎斜天南星大每防風湯化下一丸普濟方

自熬薑汁調之左貼角弓反張南星半夏等分為末左右貼左仁存方

仍灸印堂破傷中風胡氏奪命散又名玉真散治打撲金刃傷及破傷風傷濕發病

強直如癰狀者天南星防風等分為末水調敷瘡出水為妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫者熱童便

調灌二錢門毆內傷墜壓者酒和童便破傷風瘡生連灌三服即甦亦可煎服三因方

星末水調塗瘡四圍婦人頭風攻目作痛天南星一水出有効普濟方

於中以醋一盞沃之蓋定勿令透氣候冷研末每服一字以酒調下重者半錢千金方風痰頭

痛

不可忍天南星一兩荊芥葉一兩為末薑汁糊丸梧子大每食後薑湯下二十九又上清丸用天

南星茴香等分生研末鹽醋煮麴糊凡如上述服並出經効濟世方

風痰頭運

目眩吐逆

煩懣飲食不下玉壺丸用生南星生半夏各一兩天麻半兩白麵二兩為末水丸梧子大每服三十九以

水先煎沸入藥煮五七沸漉出放溫以姜湯吞之惠民和劑局方

腦風流涕

邪風入腦鼻內

結硬遂流髓涕大白南星切片沸湯泡二次焙乾每用二錢棗七箇甘草五分同煎服三四服其硬物自

出腦氣流轉髓涕自收以大蒜草茛菪末作餅隔紗貼顙前熨斗熨之或以香附草茛菪末頻吹鼻中直指

方小兒風痰

熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸用牛膽南星一兩入金錢薄荷十片丹砂一錢半

龍腦麝香各一字研末煉蜜丸芡子大每服一丸竹葉湯化下全幼心鑑

壯人風痰

及

風中氣初起星香飲用南星四錢木香一錢水  
二盞生薑十四片煎六分溫服王碩易簡方痰迷

心竅壽星丸治心膽被驚神不守舍或痰迷心竅恍  
惚健忘妄言妄見天南星一斤先掘土坑一尺

以炭火三十斤燒赤入酒五升滲乾乃安南星在內  
盆覆定以灰塞之勿令走氣次日取出為末琥珀一

兩硃砂二兩為末生薑汁打麵糊丸梧子大每服三  
十丸至五十丸煎人參石菖蒲湯下一日三服和

劑局風痰注痛方見羊痰濕臂痛右邊者南星制蒼  
方躑躅下木等分生薑三片

水煎服之風痰欬嗽大天南星一枚炮製研末每服  
摘玄方一錢水一盞薑三片煎五分溫

服每日早午晚各氣痰欬嗽玉粉丸南星麴半夏麴  
一服千金博濟陳橘皮各一兩為末自

然薑汁打糊丸如梧子大每服四十丸薑湯清氣化  
下寒痰去橘皮加官桂東垣蘭室秘藏

痰

三仙丸治中脘氣滯痰涎煩悶頭目不清生南星去皮半夏各五錢並湯泡七次為末自然薑汁和

作餅

鋪竹篩內以楮葉包覆待生黃成麴晒乾每用

二兩

入香附末一兩糊丸梧子大每服四十丸食後

薑湯下

王溫中散滯消導飲食天南星炮高良薑

礪百一選方

炮各一兩砂仁二錢半為末

薑汁糊丸梧子大每薑

酒積酒毒服此即解天南星

湯下五十九丸

和劑方

一斤土坑燒赤沃酒一斗入坑放南星盆覆泥固濟

一夜取出酒和水洗淨切片焙乾為末入硃砂末一

兩薑汁麵糊丸梧子大每服五十九薑湯下吐泄不

禁丞相呂丞相嘗用有驗楊氏家藏丸

止

四肢厥逆虛風不省人事服此則陽回名曰陽散

天南星為末每服三錢京棗三枚水二鍾煎八分

溫服未省再服

又方醋調

南星末貼足心

普濟方

腸風瀉血

諸藥不効天

焦黃色為末酒糊丸梧子大吐血不止天南星一兩

每酒下二十丸普濟方

爐灰汁浸一宿洗焙研末每服一初生貼顙頭熱鼻

錢以自然銅磨酒調下勝金方

南星炮為末水調貼顙上小兒解顙顙開不合鼻塞

灸手熨之危氏得效方

去皮為末淡醋調緋帛上貼顙門灸解頤脫臼不能

手頻熨之立効錢乙小兒直訣

用南星末薑汁調塗兩小兒口瘡白屑如鵞口不須

頰一夜即上醫說

去皮臍研末醋調塗足心男走馬疳蝕透骨穿腮生

左女右間孝忠集効方

心剗空入雄黃一塊麝煖候雄黃作汁以蓋子合

定出火毒去麝為末入麝香少許拂瘡數日甚効

經驗風蟲牙痛南星末塞孔以霜梅喉風喉痺天南

方會住去涎摘玄方

箇刺心入白僵蠶七枚紙包煨熟研末薑汁調服一錢甚者灌之吐涎愈名如聖散博濟方痰瘤

結核

南星膏治人皮肌頭面上生瘤及結核大者如拳小者如粟或軟或硬不疼不癢宜用此藥不

可輒用針灸生天南星大者一枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾者為末醋調先用針刺令氣透乃

貼之覺癢則頻貼取身面疣子

醋調南星末塗之簡易方

由跋

本經下品

釋名

集解

恭曰由跋是虎掌新根大于半夏一二倍四畔未有子牙其宿根即虎掌也藏器曰由跋生林

下苗高一尺似蒟蒻根如雞卵保昇曰春抽一莖莖端有八九葉根圓扁而肉白時珍曰此即天南星之



小者其氣未足不堪服食故醫方罕用惟重八九錢至一兩餘者氣足乃佳正如附子之側子不如附子之義也

正誤

引景曰由跋本出始興今人亦種之狀如烏翼而布地花紫色根似附子苦酒磨塗腫亦効恭

曰陶氏所說乃鳶尾根即鳶頭也又言虎掌似半夏是以鳶尾為由跋以由跋為半夏非惟不識半夏亦不識鳶尾與由跋也今南人猶以由跋為半夏時珍曰陳延之小品方亦以東海鳶頭為由跋則其訛誤矣

氣味辛苦溫有毒主治毒腫結熱

經本

藟藟

宋開寶

釋名蒟頭

寶

鬼芋

經圖

鬼頭

集解

志曰蒟頭出吳蜀葉似由跋半夏根大如碗生陰地雨滴葉下生子又有斑杖苗相似至秋有

花直出生赤子根如蒟頭毒猛不堪食虎杖亦名斑杖與此不同頌曰江南吳中出白蒟蒻亦曰鬼芋生平澤極多人采以為天南星了不可辨市中所收往往是此但南星肌細膩而蒟蒻莖斑花紫南星莖無斑花黃為異爾時珍曰蒟蒻出蜀中施州亦有之呼為鬼頭閩中人亦種之宜樹陰下掘坑積糞春時生苗至五月移之長一二尺與南星苗相似但多斑點宿根亦自生苗其滴露之說蓋不然經三年者根大如碗及芋魁其外理白味亦麻人秋後采根須淨擦或搗或片段以釀灰汁煮十餘沸以水淘洗換水更煮五六遍即成凍了切片以苦酒五味淹食不以灰汁則不成也切作細絲沸湯灼過五味調食狀如水

母繇馬志言其苗似半夏楊慎丹鉛錄言藟藟即此者皆誤也王禎農書云救荒之法山有粉葛藟藟橡

栗之利則此物亦有益于民者也其斑杖即天南星之類有斑者

根氣味辛寒有毒

李廷飛曰性冷甚不益人冷氣人少食之生則戟人喉出血

主治癰腫風毒摩傳腫上搗碎以灰汁煮成餅五味

調食主消渴

寶開

發明

機曰按三元延壽書云有人患瘵百物不思見隣家修藟藟求食之美遂多食而瘵愈又有病

肥癯者數人多食之亦皆愈

附錄菩薩草

宋圖經頌曰生江浙州郡凌冬不凋秋冬有花直出赤子如藟頭冬月采根用

味苦無毒主中諸毒食毒酒研服之又諸蟲傷  
搗汁飲并傳之婦人妊娠救嗽搗篩蜜丸服効

半夏

本經下品

釋名守田

本經

水玉

本經

地文

別錄

和姑

本經

時珍

曰禮記

月令五月半夏生

蓋當夏之半也故名  
守田會意水玉因形

集解

別錄曰半夏生槐里川谷五月八月采根暴乾  
普曰生微丘或生野中二月始生葉三三相偶

白花圓上弘景曰槐里屬扶風今第一出青州吳中  
亦有以肉白者為佳不厭陳久恭曰所在皆有生平  
澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸  
南人特重之頃來互用功狀殊異其苗似是由跋誤  
以為半夏也頌曰在處有之以齊州者為佳二月生  
苗一莖莖端三葉淺綠色頗似竹葉而生江南者似

芍藥葉根下相重上天下小皮黃肉白五月八月采根以灰裹二日湯洗暴乾蜀圖經云五月采則虛小八月采乃實大其平澤生者甚小名羊眼半夏由跋絕類半夏而苗不同數曰白傍幾子真似半夏只是咬着微酸不入藥用

修治

弘景曰凡用以湯洗十許過令滑盡不爾有毒戟人咽喉方中有半夏必須用生薑者以制其

毒故也數曰修事半夏四兩用白芥子末二兩醱醋二兩攪濁將半夏投中洗三遍用之若洗涎不盡令人氣逆肝氣怒滿時珍曰全治半夏惟洗去皮垢以湯泡浸七日逐日換湯眼乾切片薑汁拌焙入藥或研為末以薑汁入湯浸澄三日瀝去涎水曬乾用謂之半夏粉或研末以薑汁和作餅子日乾用謂之半夏餅或研末以薑汁白礬湯和作餅楮葉包置藍中待生黃衣日乾用謂之半夏麴白飛霞醫通云痰分

之病半夏為主造而為麴尤佳治濕痰以薑汁白礬湯和之治風痰以薑汁及皂莢煮汁和之治火痰以薑汁竹瀝或荊瀝和之治寒痰以薑汁礬湯入白芥子末和之此皆造麴妙法也

根氣味辛平有毒

別錄曰生微寒熟溫生令人吐熟令人下湯洗盡滑用元素曰味辛

苦性溫氣味俱薄沉而降陰中陽也好古曰辛厚苦輕陽中陰也入手陽明太陰少陰三經之才曰射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭權曰柴胡為之使忌羊血海藻飴糖元素曰熱痰佐以黃芩風痰佐以南星寒痰佐以乾薑痰痞佐以陳皮白朮多用則瀉脾胃諸血證及口渴者禁用為其燥津液也孕婦忌

之用生薑則無害

主治傷寒熱心下堅胃脹欬逆

頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗

本經

消心腹胸膈痰熱

滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療

痿黃悅澤面目墮胎

別錄

消痰下肺氣開胃健脾止嘔

吐去胸中痰滿生者摩癰腫除瘤癭氣

甄權

治吐食反

胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘡

大明

治寒痰及形寒飲冷傷

肺而欬消胸中痞膈上痰除胸寒和胃氣燥脾濕治

痰厥頭痛消腫散結

元素

治眉稜骨痛

震亨

補肝風虛

好古

除腹脹目不得瞑白濁夢遺帶下

時珍

發明

權曰半夏使也虛而有痰氣宜加用之頌曰胃冷嘔噦方藥之最要成無己曰辛者散也潤也

半夏之辛以散逆氣結氣除煩嘔發音聲行水氣而潤腎燥好古曰經云腎主五液化為五濕自入為唾入肝為泣入心為汗入脾為痰入肺為涕有痰曰嗽無痰曰欬痰者因欬而動脾之濕也半夏能泄痰之標不能泄痰之本泄本者泄腎也欬無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流濕潤燥也俗以半夏為肺藥非也止嘔吐為足陽明除痰為足太陰柴胡為之使故今柴胡湯中用之雖為止嘔亦助柴胡黃芩主往來寒熱是又為足少陽陽明也宗奭曰今人惟知半夏去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡困困則不能治水經云水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩半夏大棗各三十枚水一升煮瓶中慢火燒為熟水時呷之便已也趙繼宗曰丹溪言二陳湯治一身之痰世醫執之凡有痰者皆用夫二陳內有半夏其性燥烈若風痰寒痰濕痰食痰則相宜至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液而加病



不可不知機曰俗以半夏性燥有毒多以貝母代之  
貝母乃太陰脾經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經  
之藥何可代也夫欬吐痰虛勞吐血或痰中見血  
諸鬱咽痛喉痺肺癰肺痿瘰癧婦人乳難此皆貝母  
為向导半夏乃禁用之藥若涎者脾之液美味膏梁  
炙烤皆能生脾胃溫熱故涎化為痰久則痰火上攻  
令人昏憤口噤偏廢僵仆寒瀉不語生死旦夕自非  
半夏南星曷可治乎若以貝母代之則翹首待斃矣  
時珍曰脾無留濕不生痰故脾為生痰之源肺為貯  
痰之器半夏能主痰飲及腹脹者為其體滑而味辛  
性溫也涎滑能潤辛溫能散亦能潤故行濕而通大  
便利竅而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是  
矣潔古張氏云半夏南星治其痰而欬嗽自愈丹溪  
朱氏云二陳湯能使大便潤而小便長聊攝成氏云  
半夏辛而散行水氣而潤腎燥又和劑局方用半硫  
丸治老人虛秘皆取其滑潤也世俗皆以南星半夏

為性燥誤矣濕去則土燥痰涎不生非二物之性燥也古方治咽痛喉痺吐血下血多用二物非禁劑也二物亦能散血故破傷打撲皆主之惟陰虛勞損則非濕熱之邪而用利竅行濕之藥是乃重竭其精液醫之罪也豈藥之咎哉甲乙經用治夜不眠是果性燥者乎岐伯云衛氣行于陽陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑治法飲以半夏湯一劑陰陽既通其卧立至方用流水千里者八升揚之萬遍取清五升煮之炊以葦薪大沸入秫米一升半夏五合煮一升半飲汁一盃日三以知為度病新發者覆盃則卧汗出則已久者三飲而已

附方

舊十五  
五十三

新  
法制半夏

清痰化飲壯脾順氣用大  
半夏湯洗七次焙乾再洗

如此七轉以濃米泔浸一日夜每一兩用白礬一兩  
半溫水化浸五日焙乾以鉛白霜一錢溫水化又浸

七日以漿水慢火內煮沸焙乾收之每紅半夏法消  
爵一二粒薑湯送化下御藥院方

熱清痰涎降氣利咽大半夏湯浸焙制如上法每一  
兩入龍腦五分硃砂為衣染之先鋪燈草一重約一  
指厚排半夏于上再以燈草蓋一指厚以炒豆焙化  
之候乾取出每爵一兩粒溫水送下御藥院方

痰鎮心

祛風利膈辰砂半夏丸用半夏一斤湯泡七  
次為末篩過以水浸三日生絹濾去滓澄清

去水晒乾一兩入辰砂一錢薑汁打糊丸梧  
子大每薑湯下七十九此周府方也袖珍化痰利

氣

三仙丸方  
見虎掌下

消痰開胃

去胸膈壅滯斗門方用半夏  
湯泡焙乾為末自煎薑汁和

作餅濕紙裏煨香以熟水二盞同餅二錢入鹽五分  
煎一盞服之大壓痰毒及酒食傷極驗經驗用半

夏天南星各二兩為末水五升入壺內浸一宿去  
清水焙乾重研每服二錢水二盞薑三片煎服中

焦痰涎

利咽清頭目進飲食半夏泡七次四兩枯礬一兩為末薑汁打糊或煮棗肉和丸梧子大

每薑湯下十五丸寒痰加丁香五錢熱痰老人風痰加寒水石煨四兩名玉液丸和劑局方

大腑熱不識人及肺熱痰實不利半夏炮七次焙消石半兩為末入白麵搗勻水和丸綠豆大每薑湯下

五十丸

普濟 膈壅風痰

半夏半斤酸漿浸一宿溫湯洗五遍去惡氣日乾為末漿水搜作

餅日乾再研為末每五兩入生龍腦一錢以漿水濃脚和丸雞頭子大紗袋盛避風處陰乾每服一丸好

茶或薄荷湯嚼

搜風化痰

定志安神利頭目辰砂化痰丸用半夏麴三兩天南

下 御藥院方

星炮一兩辰砂枯礬各半兩為末薑汁打糊丸梧子大每服三十丸食後薑湯送下和劑局方

厥中風

省風湯用半夏湯泡八兩甘草炙二兩防風四兩每服半兩薑二十片水二盞煎服奇

效風痰頭運

凡用生半夏生天南星寒水石煅各一

兩天麻半兩雄黃二錢小麥麵三兩為末水和成餅

水煮浮起漉出搗丸梧子大每服五十丸薑湯下極

效亦治風痰咳嗽二便不通風風痰濕痰青壺丸半

痰頭痛潔古活法機要方南星半兩各湯炮曬乾為末薑汁和作餅焙乾入神

麴半兩白朮末二兩枳實末二兩薑汁麵糊丸梧子

大每服五十丸薑風痰喘逆凡九欲吐眩運欲倒半

湯下葉氏方薑汁浸蒸餅丸梧子大每服三十丸風痰喘急湯用

薑湯下已吐者加檳榔活法機要半夏湯洗七箇甘草炙皂莢炒各一寸薑上焦熱痰

二片水一盞煎七分溫服和劑局方欬嗽制過半夏一兩片黃芩末二錢薑汁打糊丸綠

豆大每服七十丸淡薑湯食後服此周憲王親制方

也袖珍方

# 肺熱痰嗽

制半夏枯樓仁各一兩為末薑汁打糊丸梧子大每服二三十九丸白

湯下或以栝樓瓢煮熟丸濟生方

# 熱痰嗽

煩熱面赤口燥心痛脈洪數者小黃丸用半夏

天南星各一兩黃芩一兩半為末薑汁浸蒸餅丸梧子大每服五七十九食後薑湯下潔古活法機要

# 小兒痰熱

入膽內懸風處待乾蒸餅丸綠豆大每薑

湯下三五丸

摘玄方

# 濕痰嗽

面黃體重嗜卧驚兼食不消脈緩者白朮丸用半夏南星

各一兩白朮一兩半為末薄糊丸梧子大每服五七十九薑湯下活法機要氣痰嗽白

氣促洒浙惡寒愁憂不樂脈濡者玉粉丸用半夏南星各一兩官桂半兩為末糊丸梧子大每服五十九

薑湯下活法機要

# 小結胸痛

正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胸湯主之半夏半升黃連

一兩栝樓實大者一箇水六升先煮栝樓至三升去滓內二味煮取二升分三服仲景傷寒論

痰心痛

喘急者半夏油炒為末粥糊丸綠豆大每服二十丸薑湯下丹溪心法急傷寒

病

半夏四錢生薑七片酒一盞煎服胡洽居士百病方

結痰不出

語音不清年久者亦

宜玉粉丸半夏半兩桂心一字草烏頭半字為末薑汁浸蒸餅丸炙子大每服一丸夜臥含嚥活法機

要停痰冷飲

嘔逆橘皮各一兩每服四錢生薑七片水二盞皮各一兩每服四錢生薑七片水二盞

煎一盞溫服和劑局方

停痰留飲

胸膈滿悶氣短惡心飲食不下或吐痰水茯苓半夏湯用

半夏泡五兩茯苓三兩每服四錢薑七片水一鍾半煎七分甚捷徑和劑局方

支飲作嘔

嘔家本渴不渴者心下有支飲也或似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心下憤憤並宜小半夏湯用半夏泡

七次一升生薑半升水七升煮一噦逆欲死半夏生薑湯主

之即上方也 痘瘡噦氣方同 嘔噦眩悸穀不得下半夏加

生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎一升半分溫服之 金匱要畧 目不得眠見發心

下悸忪半夏麻黃丸半夏麻黃等分為末蜜丸 傷寒

乾嘔半夏熟洗研末生薑湯 嘔逆厥逆內有寒痰半

焙研小麥麴一升水和作彈丸水煮熟初吞四五枚

肉餚糖此乃許仁則 嘔吐反胃大半夏湯半夏三升

方也 外臺秘要 水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半 胃寒

溫服一升日再服亦治脇間支飲 金匱要畧



噦逆

停痰留飲藿香半夏湯用半夏湯泡炒黃二兩

片煎服

小兒吐瀉

脾胃虛寒齊州半夏泡七次陳粟米各一錢半薑十片水殘半

煎八分溫服

小兒痰吐

或風壅所致或飲嗽發熱飲食即吐半夏泡七次半兩丁

香一錢以半夏末水和包丁香用麴重包煨熟去麴為末生薑自然汁和丸麻子大每服二三十九丸陳皮

湯下

活

妊娠嘔吐半夏二兩八參乾薑各一兩為末薑汁麴糊丸梧子大每飲服

十丸日三服

霍亂腹脹

半夏桂等分為末水服方寸匕肘後方小兒

腹脹

半夏末少許酒和丸粟米大每服二丸薑湯下不瘥加之或以火炮研末薑汁調貼臍亦佳

子母黃疸喘滿

小便自利不可除熱半夏生薑各半斤水七升煮一升五合分再服有人

氣結而死心下暖以此少  
許入口遂活張仲景方  
**伏暑引飲**  
脾胃不利消暑丸用半夏醋煮

一斤茯苓半斤生甘草半斤為末薑汁麵糊  
丸梧子大每服五十丸熱湯下  
和劑局方  
**老人虛**

**秘**冷秘及瘕癖冷氣半硫丸半夏炮炒生硫磺等分  
為末自然薑汁煮糊丸如梧子大每空心溫酒下

五十丸  
和劑局方  
**失血喘急**  
吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿宿瘀用半夏槌扁以薑汁

和麩包煨黃研末米糊丸梧子大  
每服三十丸白湯下  
直指方  
**白濁夢遺**  
半夏一兩洗十

次切破以木猪苓二兩同炒黃出火毒去猪苓入煨  
過牡蠣一兩以山藥糊丸梧子大每服三十丸茯苓

湯送下腎氣閉而一身精氣無所管攝妄行而遺者  
宜用此方蓋半夏有利性猪苓導水使腎氣通也與

下元虛墮者不同  
許學士本事方  
**八般頭風**  
三次見效半夏末入百草霜少許作紙攤燒烟

就鼻內嚙之口中含水有  
涎吐去再含 衛生寶鑑 少陰咽痛 生瘡不能言語

湯主之半夏七枚打碎雞子一枚頭開一竅去黃納  
苦酒令小滿入半夏在內以錐子坐于炭火上煎三

沸去滓置盃中時時嚙之極  
驗未瘥更作 仲景傷寒論 喉痺腫塞 生半夏末嚙  
鼻內涎出效

簡方 集 骨哽在咽 半夏白芷等分為末水服方寸  
匕當呷出忌羊肉 外臺秘要 重舌

木舌 服大塞口半夏煎醋含漱之 又方半夏二十  
枚水煮過再炮片時乘熱以酒一升浸之密封

良久熱漱 小兒顛陷 乃冷也水調半  
冷吐之 夏末塗足心 面上黑氣 半夏  
焙研

米醋調敷不可見風不計遍數從早至晚如  
此三日皂角湯洗下面瑩如玉也 摘玄方 癩風眉

落 生半夏羊屎燒焦等分為末  
自然薑汁日調塗 聖濟錄 盤腸生產 產時子腸  
先出產後

不收者名盤腸產以半夏末頻  
嚙鼻中則上也婦人良方產後運絕半夏末冷水和丸大

豆大納鼻中即愈此小兒驚風生半夏一錢皂角半  
痛鵲法也肘後方錢為末吹少許入鼻

名嚏驚散即卒死不寤半夏末吹鼻中即活南岳  
魁直指方夫人紫靈魏元君方也五

絕急病一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魔魘五  
曰產乳並以半夏末納大豆一丸入鼻中心

溫者一日可活癰疽發背及乳瘡半夏末雞子  
也子母秘錄白調塗之肘後方吹奶

腫痛半夏一箇煨研酒服立愈一方以末  
隨左右嚙鼻效劉長春經驗方打撲瘀痕

水調半夏末塗之一宿遠行足趺方同上  
即沒也永類鈴方集簡方金刃不出

入骨脉中者半夏白斂等分為末酒服方寸  
七日三服至二十日自出李荃大白經飛蟲入

耳

生半夏末麻油調塗  
耳門外

蝎蠱螫人

半夏末水調塗之  
立止 錢相公篋

中 方 蝎癭五孔

被蝎傷五孔相通者用半夏為末水調  
塗之日二次痛自止無不效者 太平

聖惠

方

莖涎主治煉取塗髮眉墮落者即生

雷敷

蚤休

本經  
下品

釋名蚩休

別錄

螫休

日華

紫河車

圖經

重臺

唐本

重樓金線

唐本

三層草

綱目

七葉一枝

花

蒙

草甘遂

唐本

白甘遂

時珍

曰

毒得此治之即休故有蚤休螫休諸名重臺三層因其葉狀也金線重樓因其花狀也甘遂因其根狀也

紫河車因  
其功用也

集解

別錄曰：蚤休生山陽川谷及宛句，恭曰：今謂重樓、金線者是也。一名重臺，南人名為甘遂。一莖

六七葉，似王孫鬼。白芨、麻、葦、葉有二、三層，根如肥大菖蒲，細肌脆，白保昇曰：葉似鬼，曰：牡蒙，年久者二三重，根如紫參，皮黃肉白。五月采根，日乾。大明曰：根如尺二蜈蚣，大如肥紫菀、蒲、頌曰：即紫河車也。今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之，葉似王孫鬼。白等作二、三層。六月開黃紫花，蕊赤黃色，上有金絲垂下。秋結紅子，根似肥薑，皮赤肉白。四月、五月采之，宗奭曰：蚤休無旁枝，止一莖，挺生，高尺餘，顛有四、五葉，葉有歧，似苦杖，中心又起莖，亦如是。生葉惟根入藥用。時珍曰：重樓、金線處處有之，生于深山陰濕之地。一莖獨上，莖當葉心，葉綠色，似芍藥。凡二、三層，每一層七葉，莖頭夏月開花，一花七瓣，有金絲蕊，長三四寸。

王屋山產者至五七層根如鬼臼蒼朮狀外紫中白有粘糯二種外丹家采制三黃砂永入藥洗切焙用俗謠云十葉一枝花深山是我家

瘰癧如遇者一似手拈拏是也

根氣味苦微寒有毒

大明曰冷無毒伏雄黃丹砂蓬砂及塩

主治驚癇

搖頭弄舌熱氣在腹中

本經

癰疾癰瘡除蝕下三蟲去

蛇毒

別錄

生食一升利水

唐本

治胎風手足搐能吐泄療

應

大明

去瘡疾寒熱

時珍

發明

恭曰摩醋傳瘰癧腫蛇毒甚有效時珍曰紫河車足厥陰經藥也凡本經驚癇瘰癧瘡疾瘰癧瘰癧腫者

宜之而道家有服食法不知果有益否也

附方

新五服

食法

紫河車根以竹刀刮去皮切作骰子大塊麪裹入瓷瓶中水煮候浮瀝出

凝冷入新布袋中懸風處待乾每服三九五更初面束念呪并水下連進三服即能休糧若要飲食先以

黑豆煎湯飲之次以藥丸煮稀粥漸食之呪曰天朗氣清金雞鳴吾今服藥欲長生吾今不飢復不渴

賴得神仙

小兒胎風

手足搐搦用蚕休即紫河車為草有靈末每服半錢冷水下衛生易

簡慢驚發搐

帶有陽證者白甘遂末即蚕休一錢括樓根末二錢同于慢火上炒焦黃研勻

每服一字煎麝香薄荷湯調下

錢乙小兒方

中鼠莽毒

金線重樓根唐水服即愈集簡方

咽喉穀賊

腫痛用重臺赤色者川大黃炒木鼈子仁馬牙消半兩半夏炮一分為末蜜丸芡子

大含之

聖惠方



鬼臼

本經下品

校正

併入圖經瑤田草

釋名九臼

本經

天臼

別錄

鬼藥

綱目

解毒

別錄

箭犀

本經

馬目毒

公害母草

本經

羞天花

綱目

木律草

綱目

瑤田草

綱目

獨脚

綱目

蓮

上宿本草

獨荷草

上宿

山荷葉

綱目

旱荷

綱目

八角盤

綱目

唐婆

綱目

鏡

弘景曰鬼臼根如射干白而味甘九曰相連有毛者良故名時珍曰此物有毒而白如馬眼故名馬

新苗生則舊苗死故有鏡盤荷蓮害母諸名蘇東坡

詩集云瑤田草俗號唐婆鏡即本草鬼臼也歲生一

曰如黃精根而堅瘦可以辟穀宋祁鉅南方物贊云

羞天花蜀地處處有之依莖綴花蔽葉自隱俗名羞

天子政為羞寒花即本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖

天子政為羞寒花即本草鬼臼也贊云冒寒而茂莖

修葉廣附莖作花葉蔽其上以其自蔽若有羞狀別有羞天草與此不同即海芋也

集解

別錄曰鬼臼生九真山谷及寬句二月八月采根弘景曰鬼臼生山谷中八月采陰乾似射干

木輩又似鉤吻有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者大而味苦無叢毛力劣今馬目毒公狀如黃精根其臼處似馬眼而柔潤今方家多用鬼臼而少用毒公不知此那復乖越如此恭曰鬼臼生深山巖石之陰葉如蓖麻重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩歧者年長一莖莖枯則為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用多是射干而江南別送一物非真者今荊州當陽縣硤州遠安縣襄州荊山縣山中並貢之亦極難得頌曰今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍亦有之並如蘇恭所說花生莖間赤色三月開後結實又一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如

鴈掌蕪端一葉如繖旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一莖既枯則生一白及八九年則八九曰矣然一年一白生而一白腐蓋陳新相易也故俗名害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之曰腐矣而本草注謂全似射干今射干體狀雖相似然曰形淺薄與鬼曰大異鬼曰如八九箇南星側比相疊而色理正如射干用者當使人求苗米之市中不復有也時珍曰鬼曰根如天南星相疊之狀故市人道謂小者為南星大者為鬼曰殊為謬誤按黃山谷集云唐婆鏡葉底開花俗名羞天花即鬼曰也歲生一白滿十二歲則可為藥今方家乃以鬼燈藥為鬼曰誤矣又鄭樵通志云鬼曰葉如小荷形如鳥掌年長一莖莖枯則根為一白亦名八角盤以其葉似之也據此二說則似是今人所謂獨腳蓮者也又名山荷葉獨荷草早荷葉八角鏡南方處處深山

陰密處有之北方惟龍門山王屋山有之一莖獨上莖生葉心而中空一莖七葉圓如初生小荷葉面青背紫揉其葉作瓜李香開花在葉下亦有無花者其根全似蒼术紫河車丹爐家采根制三黃砂汞或云其葉八角者更靈或云其根與紫河車一樣但以白色者為河車赤色者為鬼臼恐亦不然而庚辛玉冊謂蚤休陽草旱荷陰草亦有分別陶弘景以馬目毒公與鬼臼為二物殊不知正是一物而有二種也又唐獨孤滔丹房鏡源云木律草有二種根皆似南星赤莖直上莖端生葉一種葉凡七瓣一種葉作數層葉似蓖麻面青背紫而有細毛葉下附莖間一花狀如鈴鐸倒垂青白色黃蕊中空結黃子風吹不動無風自搖可制砂汞按此即鬼臼之二種也其說形狀甚明

根氣味辛溫有毒

別錄曰微溫弘景曰甘溫有毒權曰苦之才曰畏垣衣

主治

殺蟲毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒

本經

殺大

毒療欬喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳不

入湯

別錄

主尸疰殭殍勞疾傳尸瘦疾

甄權

下死胎治邪

瘡癰疽蛇毒射工毒

時珍

發明

頌曰古方治五尸鬼疰百毒惡氣多用之又曰今福州人三月采瑞田草根葉焙乾搗末蜜丸

服治風疾

附方新子死腹中

胞破不生此方累效救人歲萬數也鬼曰不拘多少黃色者去毛為

細末不用篩羅只撚之如粉為度每服一錢無灰酒一盞同煎八分通口服立生如神名一字神散婦

人良

射工中人

寒熱發瘡鬼白葉一把苦酒漬搗黑取汁服一升日二次千金方

黃急病

黑黃面黑黃身如土色不妨食脈沉若青脈入口者死宜烙口中黑脈耳會玉泉章門心

俞用生鬼曰搗汁一小盞服乾者為末水服三十六黃方

射干

本經下品

釋名烏扇

本經

烏翬

別錄

烏吹

別錄

烏蒲

本經

鳳翼

拾遺

鬼扇

土宿

扁竹

綱目

仙人掌

土宿

紫金牛

土宿

野萱花

綱目

草薑

別錄

黃遠

吳普弘景曰射干方書多音夜頌曰射干之形莖梗疎長正如射之長竿之狀得名由此爾而陶氏以夜音為疑蓋古字音多通呼若漢官僕射主射事而亦音夜非有別義也時珍曰其葉叢生橫鋪一面如鳥

翅及扇之狀故有烏扇烏翼鳳翼鬼扇仙人掌諸名俗呼扁竹謂其葉扁生而根如竹也根葉又如蠻薑

故曰草薑 翼

音所甲切扇也

集解

別錄曰射干生南陽山谷田野三月三日采根陰乾弘景曰此是烏翼根黃色庭臺多種之人

言其葉是鳶尾而復有鳶頭此若相似爾恐非烏翼也又別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用恭曰鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白名鳶頭保昇曰射干高二三尺花黃實黑根多鬚皮黃黑肉黃赤所在皆有二月八月采根去皮日乾藏器曰射干鳶尾二物相似人多不分射干即人間所種為花草名鳳翼者葉如鳥翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間所種苗低下於射干狀如鳶尾夏生紫碧花者是也大明曰射干根潤形似高良薑大小赤黃

色淡硬五六七八月采頌曰今在處有之人家種之  
春生苗高一二尺葉大類蠻薑而狹長橫張疎如翅  
羽狀故名烏翼葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開  
花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說  
射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云  
西方有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也  
陶弘景所說花白者自是射干之類震亨曰根為射  
干葉為烏翼紫花者是紅花者非机曰按諸注則射  
干非一種有花白者花黃者花紫者花紅者丹溪獨  
取紫花者必曾試有驗也時珍曰射干即今扁竹也  
今人所種多是紫花者呼為紫蝴蝶其花三四月開  
六出大如萱花結房大如梅指頗似泡桐子一房四  
隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫極硬咬之不破  
七月始枯陶弘景謂射干鳶尾是一種蘇恭陳藏器  
謂紫碧花者是鳶尾紅花者是射干韓保昇謂黃花  
者是射干蘇頌謂花紅黃者是射干白花者亦其類



朱震亨謂紫花者是射干紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云鳶尾射干也易通卦驗云冬至射干生土宿真君本草云射干即扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鳶尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠藏器曰射干之名有三佛經射干貂摠此是惡獸似青黃狗食人能緣木阮公云射干臨層城者是樹珠有高大者本草射干是草即今人所種者也

根修治

穀曰凡采根先以米泔水浸一宿漉出然後以蘆竹葉煮之從午至亥日乾用

氣味苦平有毒

別錄曰微溫久服令人虛保昇曰微寒權曰有小毒元素曰苦陽中陰也

時珍曰寒  
多服瀉人

主治欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結

氣腹中邪逆食飲大熱

本經

療老血在心脾間欬唾言

語氣臭散胸中熱氣

別錄

苦酒摩塗毒腫

弘景

治疰氣消

瘀血通女人月閉

甄權

消痰破癥結胸膈滿腹脹氣喘

疰癰開胃下食鎮肝明目

大明

治肺氣喉痺為佳

宗奭

去

胃中癰瘡

元素

利積痰疝毒消結核

震亨

降實火利大腸

治瘡母

時珍

發明

震亨曰射干屬金有木與火行太陰厥陰之積  
痰使結核自消甚捷又治便毒此足厥陰濕氣

因疫勞而發取射干三寸與生薑同煎食前服利三  
兩行甚效時珍曰射干能降火故古方治喉痺咽痛  
為要藥孫真人千金方治喉痺有烏翼膏張仲景金  
匱玉函方治欬而上氣喉中作水鷄聲有射干麻黃  
湯又治瘡母鼈甲煎丸亦用烏扇燒過皆取其降厥  
陽相火也火降則血散腫消而痰結自解癰瘕自除  
矣

附方

新舊二

咽喉腫痛

射干花根山豆根陰乾為末吹之如神袖珍方

傷寒

咽閉

腫痛用生射干猪脂各四兩合煎令焦去滓每禽囊許取瘥

喉痺不

通

藥水不入外臺秘要用射干一片含嚥汁良醫方大成用扁竹新根搗汁嚥之大肺動即解或醋

研汁禽引涎出亦妙便民方用紫蝴蝶根一錢黃芩生甘草桔梗各五分為末水調頓服立愈名奪命

散

二便不通

諸藥不效紫花扁竹根生水邊水蠱腹者佳研汁一盞服即通普濟

大

動搖水聲皮膚黑用鬼扇根搗汁服一盃水即下

陰疝腫刺

發時腫痛如刺

用生射干搗汁與服取

肘後方

乳癰初腫

扁竹根如僵蠶者同萱草根為末蜜

調傳之神效

中射工毒

生瘡者烏翼升麻各二兩水三升煎二升溫服以滓傳瘡

上姚僧坦集驗方

鳶尾

本經下品

釋名烏園

本經

根名鳶頭

時珍曰並以形命名烏園當作烏鳶

集解

別錄曰烏鳶生九疑山谷五月采弘景曰方家言是射干苗而主療亦是當別是一種方用鳶

頭當是其根瘠體相似而本草不題恭曰此草所在有之人家亦種葉似射干而潤短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白嚼之戟人咽喉與射干全別射干花紅抽莖長根黃有白保昇曰草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數箇相連九月十月采根日乾時珍曰此即射干之苗非別一種也肥地者莖長根粗瘠地者莖短根瘦其花自有數色諸家皆是強分陳延之小品方言東海鳶頭即由疏者亦訛也東海出之故耳

氣味苦平有毒

恭曰有小毒

主治蠱毒邪氣鬼症諸毒破

癥瘕積聚去水下三蟲

經本

殺鬼魅療頭眩

別錄

附方

舊一

飛尸遊蠱

著喉中氣欲絕者鳶尾根削去皮納喉中摩病處令血出為佳

陳藏器遺鬼魅邪氣四物爲頭散東海爲頭黃牙即

本草拾遺寸七欲令病人見鬼增防葵一分欲令知鬼又增一分立驗不可多服陳延之小品方

玉簪

綱目

釋名白鶴仙

時珍曰並以花象命名

集解

時珍曰玉簪處處人家栽爲花草二月生苗成叢高尺許柔莖如白菰其葉大如掌圓而有尖

葉上紋如車前葉青白色頗嬌瑩六七月抽莖莖上有細葉中出花朵十數枚長二三寸本小末大未開時正如白玉搔頭簪形又如羊肚蘑菇之狀開時微綻四出中吐黃蕊頗香不結子其根連生如鬼臼射干生薑輩有鬚毛舊莖死則根有一白新根生則舊根腐亦有紫花者葉微狹皆鬼臼射干之屬

根氣味甘辛寒有毒主治搗汁服解一切毒下骨硬

塗癰腫

時珍

附方

新五

乳癰初起

內消花即玉簪花酒服以渣傳之

海上方

婦人斷

產

白鶴仙根白鳳仙子各一錢半紫葳二錢半辰砂二錢搗末蜜和丸梧子大產內三十日以酒半盞

服之不可着牙齒也

摘玄方

解斑蝥毒

玉簪根搗水服之即解趙真人濟急方

下魚骨哽

玉簪花根山裏紅果根同搗自然汁以竹筒灌入咽中其骨自下不可着牙齒

仙乾坤生意

刮骨取牙

玉簪根乾者一錢白砒三分白礬七分蓬砂二分威靈仙三分草烏

頭一分半為末以少許點疼處即自落也余居士選奇方

葉氣味

同根

主治蛇虺螫傷搗汁和酒服以渣傳之中

心留孔洩氣

時珍

鳳仙

綱目

釋名急性子

救荒

旱珍珠

綱目

金鳳花

綱目

小桃紅

救荒

夾竹

桃

救荒

海薊

音

染指甲草

救荒

菊婢

時珍

曰其花頭翅尾

足具翹翹然如鳳狀

故以名之女人采其花及葉包染指甲其實狀如小桃老則迸裂故有指甲急性小桃諸名宋光宗李后

諱鳳宮中呼為好女兒花張宛

丘呼為菊婢韋居呼為羽客

集解

時珍曰鳳仙人家多種之極易生二月下子五月可再種苗高二三尺莖有紅白二色其大如



指中空而脆葉長如尖似桃柳葉而有鋸齒極間開  
花或黃或白或紅或紫或碧或雜色亦自變易狀如  
飛禽自夏初至秋盡開謝相續結實景然大如櫻桃  
其形微長色如毛桃生青熟黃犯之即自裂皮卷如  
奉苞中有子似蘿蔔子而小褐色人采其肥莖汨配  
以充蒿笋嫩華酒浸一宿亦可食但此草不生虫蠹  
蜂蝶亦不近恐亦不能無毒也

子氣味微苦溫有小毒主治產難積塊噎膈下骨哽

透骨通竅

時珍

發明

時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨軟堅厄人烹魚肉硬者投數粒即易軟爛是其驗也緣其

透骨最能損齒與玉簪根同凡服者不可着齒也多用亦戟人咽

附方

新

五產難催生

鳳仙子二錢研末水服勿近牙外  
以蓖麻子隨年數搗塗足心集

蘭噎食不下

鳳仙花子酒浸三宿曬乾為末酒丸綠  
豆大每服八粒溫酒下不可多用即急

性子也  
摘玄方

咽中骨哽

欲死者白鳳仙子研水一大呷  
以竹筒灌入咽其物即軟不可

經牙或為末吹  
晉濟方

牙齒欲取

金鳳花子研末入硃少許  
點疼牙根取之摘玄方

小兒痞積

急性子水蘇花子大黃各一兩俱生研末  
每味取五錢外用皮消一兩拌勻將白鵝

鵝一箇或白鴨亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨  
將末裝入內用線紮定沙鍋內入水三碗重重紙封

以小火煮乾將鵝鴨翻調焙黃色冷定早晨食之日  
酉時疾軟三日大便秘下血病去矣忌冷物百日孫

天仁集  
效方

花氣味甘滑溫無毒主治蛇傷搗酒服即解又治腰脇引痛不可忍者研餅晒乾為末空心每酒服三錢

活血消積

時珍

附方

新

風濕卧床

不起用金鳳花栢子仁朴消木瓜煎湯洗浴每日二三次內服獨活

寄生湯

吳

是扶壽精方

根葉氣味苦甘辛有小毒主治雞魚骨哽誤吞銅鐵

杖櫟腫痛散血通經軟堅透骨

時珍

附方

新

三咽喉物硬

金鳳花根嚼爛噙嚥骨自下雞骨尤效即以溫水漱口免損齒也亦

治誤吞銅鐵  
危氏得效方

### 打杖腫痛

鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即

愈冬月收取乾者研末水塗之  
紫廷器通變要法

### 馬患諸病

白鳳仙花連根葉熬膏遇

馬有病抹其眼四角上即汗出而愈  
衛生易簡方

### 坐拏草

宋圖經

### 集解

頌曰生江西及滁州六月開紫花結實采其苗入藥甚易得後因人用有效今頗貴重時珍曰

按一統志云出吉安永豐縣

### 氣味辛熱有毒主治風痺壯筋骨兼治打撲傷損

蘇頌

### 發明

頌曰神醫普救方治風藥中已有用者時珍曰危氏得效方麻藥煮酒方中用之聖濟錄治腸

上虛熱咽喉噎塞小便赤瀉神困多睡有坐擘丸用  
坐擘草大黃赤芍芍藥木香升麻麥門冬黃芩木通酸  
棗仁薏苡仁枳殼等分為末蜜丸  
梧子大每服二十丸麥門冬湯下

附錄押不蘆

時珍曰按周密癸辛雜志云漠北回回  
地方有草名押不蘆土人以少許磨酒

飲即通身麻痺而死加以刀斧亦不知至三日則以  
少藥投之即活御藥院中亦儲之貪官污吏罪甚者  
則服百日丹皆用此也昔華佗  
能剗腸滌胃豈不有此等藥耶

曼陀羅花

綱目

釋名風茄兒

綱目

山茄子

時珍曰法華經言佛說法時  
天雨曼陀羅花又道家北斗

有陀羅星使者手執此花故後人因以名花曼陀羅  
梵言雜色也茄乃因葉形爾姚伯聲花品呼為惡客

集解

時珍曰曼陀羅生北土人家亦栽之春生夏長獨莖直上高四五尺生不旁引綠莖碧葉葉如

茄葉八月開白花凡六瓣壯如牽牛花而大攢花中折駢葉外包而朝開夜合結實圓而有丁拐中有小

子八月采花

九月采實

花子氣味辛溫有毒主治諸風及寒濕脚氣煎湯洗

之又主驚癇及脫肛并入麻藥

時珍

發明

時珍曰相傳此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞子常試之飲須半酣更令一人或

笑或舞引之乃驗也八月采此花七月采火麻子花陰乾等分為末熱酒調服三錢少頃昏昏如醉割瘡

灸火宜先服此則不覺苦也

附方

新

面上生瘡

曼陀羅花

晒乾研末少許貼之

小兒慢驚

衛生易簡方

曼陀羅花七朶重一字天麻二錢半全蝎炒十枚天南星炮丹砂乳香各二錢半為末每服半錢薄荷湯

調下

御

大腸脫肛

曼陀羅子連殼一對掾斗十六箇同剉水煎三五沸入朴消少

藥院方

許洗之  
儒門事親

羊躑躅

本經  
下品

釋名黃躑躅

綱目

黃杜鵑

蒙

羊不食草

拾遺

開羊花

綱目

驚

羊花

綱目

老虎花

綱目

玉枝

別錄

弘景曰羊食其葉躑躅而死故名閭當作惱惱亂也

集解

別錄曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山三月采花陰乾弘景曰近道諸山皆有之花黃似鹿

葱不可近眼恭曰花亦不似鹿葱正似旋花色黃者也保昇曰小樹高二尺葉似桃葉花黃似瓜花三月四月采花日乾頌曰所在有之春生苗似鹿蔥葉似紅花莖高三四尺夏開花似凌霄花山石榴輩正黃色羊食之則死今嶺南蜀道山谷遍生皆深紅色如錦繡然或云此種不入藥時珍曰韓保昇所說似桃葉者最的其花五出蕊瓣皆黃氣味皆惡蘇頌所謂深紅色者即山石榴名紅躑躅者無毒與此別類張揖廣雅謂躑躅一名決光者誤矣決光決明也按唐李紳文集言駱谷多山枇杷毒能殺人其花明艷與杜鵑花相似樵者識之其說似羊躑躅未知是否要亦其類耳

花氣味辛溫有大毒

權曰惡諸石及麴不入湯使  
伏丹砂礪砂雌黃畏卮子主

治賊風在皮膚中淫淫痛溫瘡惡毒諸痺

本經

邪氣鬼



疰毒

別錄

發明

頌曰古之大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類并治風諸酒方皆雜用

之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散云甚勝時珍曰此物有大毒曾有人以其根入酒飲遂至於斃也和劑局方治中風癱瘓伏虎丹中亦用之不多服耳

附方

新

風痰注痛

躑躅花

天南星並生時同搗作餅

時取焙為末蒸餅丸梧子大每服三丸溫酒下腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良續傳信方

痛

風走注

黃躑躅根一把糯米一盞黑豆半盞酒水各一盞除餘服大吐大泄一服便能動也醫

學集

風濕痺痛

手足身體收攝不遂肢節疼痛言語

成末每以牛乳一合酒二

合調服五分

聖惠方風蟲牙痛

躑躅一錢草烏頭二錢半為末化臘

丸豆大綿包一丸咬之追涎海上仙方

附錄山躑躅

時珍曰處處山谷有之高者四五尺低者一二尺春生苗葉淺綠色枝少而花

繁一枝數萼二月始開花如羊躑躅而蒂如石榴花有紅者紫者五出者千葉者小兒食其花味酸無毒一名紅躑躅一名山石榴一名映山紅一  
名杜鵑花其黃色者即有毒羊躑躅也  
拾遺藏器曰生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是也味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病瘡之亦浸酒服時珍曰此草似羊躑躅而云無毒蓋別有此也

芫花

本經下品

校正

自本部移入此

釋名杜芫

別錄

赤芫

吳普

去水

本經

毒魚

別錄

頭痛花

綱目

兒草

吳普敗華

吳普

根名黃大戟

吳普

蜀桑

別錄

時珍曰芫或作  
玩其義未詳去水言

其功毒魚言其性大戟言其似也俗人因其氣  
惡呼為頭痛花山海經云首山其草多芫是也

集解

別錄

曰芫花生淮源川谷三月三日采花陰乾  
普曰芫根生邯鄲二月生葉青色加厚則黑華

有紫赤白者三月實落盡葉乃生三月采花五月采  
葉八月九月采根陰乾保昇曰近道處處有之苗高  
二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月  
花發紫碧色葉未生時收采日乾葉生花落即不堪  
用也頌曰在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入  
土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳

枝葉二月間紫花頗似紫荆而作穗又似藤花而細  
今絳州出者花黃謂之黃堯花時珍曰顧野王玉篇  
云堯水出豫章煎汁藏果及卵不壞洪邁容齋隨筆  
云今饒州處處有之莖幹不純是木小入爭鬪者取  
葉按擦皮膚輒作赤腫如被傷以誣人  
至和鹽擦卵則又染其外若赭色也

**修治**

弘景曰用當微熬不可近眼時珍曰堯花留數  
年陳久者良用時以好醋煮十數沸去醋以水

浸一宿晒乾用則毒滅  
也或以醋炒者次之

**氣味**

根同

**辛溫有小毒**

別錄曰苦微溫普曰神農黃帝  
雷公苦有毒扁鵲岐伯苦李當

之有大毒多服令人洩之  
才曰決明為之使反甘草

**主治欬逆上氣喉鳴喘咽**

**腫短氣蟲毒鬼瘡疔瘰癧腫殺蟲魚**

經本

**消胸中痰水**

喜唾水腫五水在五臟皮膚及腰痛下寒毒肉毒根

療疥瘡可用毒魚

別錄

治心腹脹滿去水氣寒痰涕唾

如膠通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急

不能行步

甄權

療欬嗽瘡瘡

大明

治水飲痰癖脇下痛

時珍

發明

時珍曰

張仲景治傷寒太陽證表不解心下有

水氣乾嘔發熱而欬或喘或利者小青龍湯主

之若表已解

有時

頭痛出汗惡寒心下有水氣乾嘔

痛引兩脇或喘

或欬者

十棗湯主之益小青龍治未

發散表邪使水氣

自毛竅而出

乃內經所謂開鬼門

法也

十棗湯

驅逐裏邪使水氣自大小便而洩乃內

經所謂潔淨府

去陳莖法也

夫飲有五皆由內啜水

漿外受濕氣

鬱蓄而為

留飲流于肺則為支飲令人

喘效寒熱吐沫背寒流于肝則為懸飲令人欬唾痛  
引缺盆兩脇流于心下則為伏飲令人胸滿嘔吐寒  
熱眩運流于腸胃則為痰飲令人腹鳴吐水胸脇支  
滿或作泄瀉忽肥忽瘦流于經絡則為溢飲令人沉  
重注痛或作水氣肘腫莧花大戟甘遂之性逐水洩  
濕能直達水飲窠囊隱僻之處但可徐徐用之取效  
甚捷不可過劑洩人真元也陳言三因方以十棗湯  
藥為末用棗肉和丸以治水氣喘急浮腫之證蓋善  
變通者也楊士瀛直指方云破癰須用莧花行水後  
便養胃可也好古曰水者肺腎脾三經所主有五臟  
六腑十二經之部分上而頭中而四肢下而腰脚外  
而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有尺寸之殊浮沉之  
別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之若誤投  
之則害深矣莧花與甘草相反而胡洽居士方治痰  
癖飲癖以甘遂大戟莧花大黃甘草同用  
蓋欲其大吐以泄濕因相反而相激也

正誤

慎微曰三國志云魏初平中有青牛先生常服芫花年百餘歲常如五六十人時珍曰芫花乃

下品毒物豈堪久服此方外迂怪之言不足信也

附方

舊五新

卒得效嗽

芫花一升水三升煮汁一升以棗十四枚煮汁乾日食五

枚必愈

卒嗽有痰

芫花一兩炒水一升煮四沸去滓白糖入半斤每服棗許勿食酸醎

物仲脩張文

喘嗽失音

暴傷寒冷喘嗽失音取芫花連根一虎口切暴乾令病人以薦

自裏春令灰飛揚入其七孔中當眼冷出口

乾嘔脇

痛

傷寒有時頭痛心下痞滿痛引兩脇乾嘔短氣汗出不惡寒者表解裏未和也十棗湯主之芫花熬

甘遂大戟各等分為散以大棗十枚水一升半煮取八合去渣納藥強人服一錢羸人半錢平旦服之當

下利病除如不除明旦更服仲景傷寒論

水腫支飲

及癰飲用十棗湯加大黃甘草五物

各一兩大棗十枚同煮如法服一方加芒消一兩胡洽百病方

天行煩亂

凝雪湯治天行

毒病七八日熱積胸中煩亂欲死用芫花一斤水三升煮取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除

當溫四肢護厥逆也千金方久瘡結癖

在腹脇堅痛者芫花炒二兩味砂五錢為末蜜丸梧

子大每服十丸棗湯下直指

水蠱脹滿

芫花枳殼等分以醋煮芫花至爛乃下枳殼煮爛搗

丸梧子大每服三十丸白湯下普濟方

酒疸尿黃

發黃心懊痛足脛滿芫花椒目等分燒末

水服半錢日二服肘後

背腿間痛

一點痛不可忍者芫花根末米醋調傅之如不佳以帛束

之婦人產後有諸般氣痛此尤宜袖珍

芫花醋煮半兩玄胡索炒一兩半為末每服一錢男



子元臟痛葱酒下瘧疾烏梅湯下婦人血氣痛當歸酒下諸氣痛香附湯下小腸氣痛茴香湯下仁存

鬼胎癥瘕

經候不通芫花根三兩剉炒黃為末每服一錢桃仁煎湯調下當利惡物而愈聖

惠催生去胎

芫花根剝皮以綿裹點麝香套入產後陰穴三寸即下攝生妙用方

惡物

不下芫花當歸等分炒為末調一錢服保命集心痛有蟲芫花一兩醋炒雄黃

一錢為末每服一字溫醋湯下乾坤生意

牙痛難忍

諸藥不效芫花末擦之令熱痛定以

溫水漱之

白禿頭瘡

芫花末猪脂和集效方癰腫初起芫花末和

膠塗之

癰瘡已潰

芫花根皮搓作揪挿入則不瘡瘡生合令膿易竭也集簡方

乳核

芫根一握洗淨入木臼搗爛入少水絞汁於石器中慢火煎成膏將絲線於膏內度過以

線繫痔當微痛候痔乾落以紙揩蘸膏納穀內去根當永除根也一方只搗汁浸線一夜用不得使水

經療瘰癧初起氣壯人用芫根搗水一盞服大吐利即驗平黃州陳大用所傳瀕湖集簡方

便毒初起芫根搗水服以渣傳之得下即消黃州熊珍所傳瀕湖集簡方贅瘤焦

法甘草煎膏筆粧瘤之四圍上三次乃用芫花大戰甘遂等分為末醋調別以筆粧其中勿近甘草次

日縮小又以甘草膏粧小暈三次如前一切菌毒因仍上此藥自然焦縮危氏得效方

虫毒氣熏蒸所致用芫花生研新汲水服一錢以利為度危氏得效方

莢花  
音饒  
經下品  
本

釋名時珍曰芫者饒也其花繁饒也

集解

別錄曰：莧花生咸陽川谷及河南中牟六月采花陰乾。弘景曰：中牟者時從河上來，形似莧花。

而極細，白色，恭曰：苗似胡荽，莖無刺，花細黃色。四月五月收，與莧花全不相似也。保昇曰：所在有之。以雍州者為好，生岡原上，苗高二尺許。宗奭曰：今京洛間甚多，時珍曰：按蘇頌圖經言絳州所出莧花黃色，謂之黃莧花，其圓小，株花成簇，生恐即此莧花也。生時色黃，乾則如白，故陶氏言細白也。或言無莧花，以桃花代之，取其利耳。

氣味苦寒有毒

別錄曰：辛微寒有毒

主治傷寒溫瘧下十二水

破積聚大堅癥瘕蕩滌胸中留癖飲食寒熱邪氣利

水道

本經

療痰飲欬嗽

別錄

治欬逆上氣喉中腫滿症氣

蠱毒瘰癧氣塊

甄權

發明

宗奭曰張仲景傷寒論以莧花治利者取其行水也水去則利止其意如此今用之當斟酌不

可過使與不及也須有是證乃用之好古曰仲景小青龍湯云若微利去麻黃加莧花如雞子大熬令赤色用之蓋利水也時珍曰莧花蓋亦先花之類氣味主治大畧相近

醉魚草

綱目

釋名 鬧魚花

綱目

魚尾草

綱目

欖木

集解

時珍曰醉魚草南方處處有之多在整岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有

微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月開花成穗紅紫色儼如莧花一樣結

細子漁人采花及葉以毒魚盡圍圍而死呼為醉魚  
兒草池沼邊不可種之此花色狀氣味並如芫花毒  
魚亦同但花開不同時為異爾按山海經云熊耳山  
有草焉其狀如蘇而赤華名曰葶藶可以毒魚其此  
草之類與

花葉氣味辛苦溫有小毒主治痰飲成齁遇寒便發  
取花研末和米粉作糰炙熟食之即效又治誤食石  
斑魚子中毒吐不止及諸魚骨鯁者搗汁和冷水少  
許嚥之吐即止骨即化也久瘡成癰者以花填鯽魚  
腹中濕紙裹煨熟空心食之仍以花和海粉搗貼便

消時珍

莽草

本草下品

校正

自木部移入此

釋名蒺藜

音

芒草

山海經

鼠莽

弘景曰莽本作蒺藜字俗訛呼爾時珍曰此物有

毒食之令人迷罔故名山人以毒鼠謂之鼠莽

正誤

別錄曰一名蒺藜一名春草禹錫曰按爾雅云蒺藜春草孫炎注云藥草也俗呼為蒺藜郭璞注云

一名芒草所見異也時珍曰蒺藜音尾白薇也薇蒺藜字音相近爾別錄白薇下云一名春草而此又以為蒺藜草蓋因孫炎之誤也今正之

集解

別錄曰莽草生上谷山谷及冤句五月米葉陰乾弘景曰今東間處處皆有葉青辛烈者良又

用搗以和陳粟米粉納水中魚吞即死浮出人取食之無妨頌曰今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五月七月米葉陰乾一說藤生繞木石間既謂之草乃藤生者是也宗奭曰莽草諸家皆謂之草而本草居木部今世所用皆木葉如石南葉枝梗乾則縋揉之其臭如椒穀曰凡用葉勿用尖及攀生者時珍曰范子計然云莽草出三輔青色者善

### 葉修治

穀曰凡使取葉細剉以生甘草水蓼二味同盛入生稀絹袋中甑中蒸一日去二件煞乾

用

### 氣味辛溫有毒

普曰神農辛雷公桐君苦有毒時珍曰莽草制雖黃雄黃而有毒誤食害

人惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解豆汁澆其根即爛性相制也

### 主治風頭癰腫

乳癰疽瘻除結氣疥癩殺蟲魚

經本

療喉痺不通乳難

頭風癢可用沐勿令入眼

別錄

治風疽疔氣腫墜凝血

治療癰除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂

赤小豆為末雞子白調如糊煖毒腫乾更易上

甄權

治

皮膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛

大明

發明

頌曰古方治風毒痺厥諸酒皆用蒟草今醫家取葉煎湯熱含少頃吐之治牙齒風虫及喉痺

甚效宗奭曰濃煎湯淋濕皮膚麻痺周禮煎氏掌除蟲物以蒟草熏之則死時珍曰古方治小兒傷寒有莽草湯又項碎錄云思村王氏之子生七日而兩腎縮入二醫云此受寒氣而然也以硫黃茱萸大蒜研



塗其腹以荷草蛇床子  
燒烟熏其下部而愈也

附方

新舊四賊風腫痺

風入五臟恍惚宜莽草膏主之  
莽草一斤烏頭附子躑躅各二

兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下  
絞去滓向火以手摩病上三百度應手即瘥若耳鼻

疾可以綿裹塞之疥癬小兒風癩數十發又治大人  
難瘡宜摩之肘後

賊風莽草雷丸各一雞子黃大化猪脂一斤煎七沸  
去滓摩痛處勿近目及陰日凡三四次外臺秘要

頭風久痛

莽草煎湯沐之勿風蟲牙痛  
肘後方用莽草煎湯熱漱

冷吐

一加羌花 一加山椒皮 一加獨活 一加郁李仁

一加羌花 一加川椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐

聖惠用莽草半兩皂角三挺去皮子漢椒七粒  
為末棗肉凡芥子大每以一九塞孔中吐涎取效瘰

癰結核

貼之日二易取效止

癰瘡未潰

方同上得

乳腫不消

荈草小豆等分為末苦酒和傳之

悶

浸椒水調荈草末傳之便民圖纂

茵芋

本經下品

釋名莞草

別錄卑共

別錄時珍曰茵芋本作因預未詳其義莞草與莆莞名同

集解

別錄曰茵蕒生太山川谷三月三日采葉陰乾弘景曰好者出彭城今近道亦有莖葉狀似荈

草而細軟連細莖采之方用甚稀惟合療風酒大明曰出自海鹽形似石南樹生葉厚五六月米頌曰今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五

月結實三月四月  
七月采莖葉日乾

莖葉氣味苦溫有毒

別錄曰微溫有毒  
權曰苦辛有小毒

主治五臟邪

氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀發作有時諸關節風濕痺

痛

本經

療久風濕走四肢脚弱

別錄

治男子女人軟脚毒

風拘急攣痛

甄權

一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥灸用

大明

發明

時珍曰千金外臺諸古方治風痼有茵陳丸治  
風痺有茵陳酒治婦人產後中風有茵陳膏風

濕諸方多用茵陳石南莽草皆古人

治風妙品而近世罕知亦醫家疎缺也

附方

舊一  
新二

茵蔯酒

治賊風手足枯痺拘攣用茵蔯附子天雄烏頭秦艽女萎防風附己

石南葉躑躅花細辛桂心各一兩十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七夏三春秋五日藥成每服一

合日二服以微痛為度方出胡茵蔯丸治風氣積滯治居士百病方圖經本草

痛者茵芋葉炒薤苳仁各半兩郁李仁一兩牽牛子三兩生研末半兩右為末煉蜜丸如梧子大每服二

十丸五更薑棗湯下取利產後中風茵芋五兩木防未利再服取快本事方已半斤苦酒丸

升漬一宿猪脂四斤煎三上三下膏成每服熱摩千遍千金方

石龍芮

本經中品

校正

併入菜部水莖

釋名地椹

本經

天豆

別錄

石能

別錄

魯果能

別錄

水莖

吳普音謹又音

芹  
苦莖

爾雅

莖葵

郭璞

胡椒菜

救荒

彭根

別錄

弘景曰生于石上其葉莖短

小故名恭曰實如桑椹故名地椹禹錫曰爾雅云齧苦莖也郭璞云即苦莖也本草言味甘而此云苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也時珍曰莖莖細兒其堪之子細莖故名地椹以下皆子名也水莖以下皆苗名也苗作蔬食味辛而滑故有椒葵之名唐本草菜部水莖條重出今依吳普本草合併為一

集解

別錄曰石龍莖生大山川澤石邊五月五日采子二月八月采皮陰乾弘景曰今出近道子形

粗似蛇牀子而扁非真好者人言是菹菜子也東山石上所生者其葉莖短小其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃是真也恭曰今用者俗名水莖苗似附子實如桑椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子閩中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者為真未為通論又曰莖菜野生非人所

種葉似葢花紫色藏器曰爾雅云茝葦草注云烏頭  
苗也蘇恭注天雄亦云石龍芮葉似葦草故名水葦  
據此則葦草是烏頭苗水葦定是石龍芮更非別草  
也頌曰今惟出兗州一叢數莖莖青紫色每莖三葉  
其葉短小多刻缺子如葶藶而色黃蘇恭所說乃水  
葦非石龍芮也兗州所生者正與本草及陶氏說合  
為得其真宗奭曰石龍芮有兩種水中生者葉光而  
子圓陸地生者葉毛而子銳入藥須水生者陸生者  
又謂之天灸而補不足莖冷失精時珍曰蘇恭言水  
葦即石龍芮蘇頌非之非矣按漢吳普本草石龍芮  
一名水葦其說甚明唐本草菜部所出水葦言其苗  
也本經石龍芮言其子也寇宗奭所言陸生者乃是  
毛葦有大毒不可食水葦即俗稱胡椒菜者處處有  
之多生近水下濕地高者尺許其根如薺二月生苗  
叢生圓莖分枝一枝三葉葉青而光滑有三尖多細  
缺江淮人三四月采苗論過晒蒸黑色為蔬四五月

閒細黃花結小實大如豆狀如初生桑椹青綠色樣散則子甚細如葶藶子即石龍芮也宜半老時采之

范子計然云石龍芮

出三輔色黃者善

子

根皮同

氣味苦平無毒

普曰神農苦平岐伯酸扁鵲大寒雷公鹹無毒之才曰大

戟為之使畏  
茱萸蛇蛻皮

主治風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩

滿久服輕身明目不老

本經

平腎胃氣補陰氣不足失

精莖冷令人皮膚光澤有子

別錄

逐諸風除心熱燥

大明

發明

時珍曰石龍芮乃平補之藥古方多用之其功與枸杞覆盆子相埒而世人不知用何哉

水堇氣味甘寒無毒

時珍曰微辛苦瀉

主治搗汁洗馬毒瘡

并服之又塗蛇蝎毒及癰腫

唐本

久食除心下煩熱主

寒熱鼠瘻癰癰生瘡結核聚氣下瘀血止霍亂又生

搗汁半升服能殺鬼毒即吐出

孟詵

發明

說曰莖葉止霍亂與香莢同功香莢即香蒿也

附方

舊二新

一結核氣

莖葉日乾為末油煎成膏摩之蛇

咬傷瘡

生薑杵汁塗之萬畢術

血疔初起

胡椒葉葉按搗之集簡方

毛茛

音民拾遺

校正

併入毛茛

釋名毛建草

拾遺

水茛

綱目

毛茛

音芹

天灸

行義

自灸

綱目

猴蒜



時珍曰葭乃草烏頭之苗此草形狀及毒皆似之故名附後方謂之水葭又名毛建亦葭字音訛也俗名毛葭似水葭而有毛也山人截瘡采葭按貼寸口一夜作泡如火燎故呼為天灸自灸

集解

藏器曰陶注鉤吻云或是毛葭蘇恭云毛葭是有毛石龍芮也有毒與鉤吻無干葛洪百一方

云葭中有水葭葉圓而先生水旁有毒蟹多食之人誤食之狂亂如中風狀或吐血以甘草汁解之又曰毛建草生江東地田野澤畔葉如芥而大上有毛花黃色子如蒺藜時珍曰毛建毛葭即合毛葭也下濕處即多春生苗高者尺餘一枝三葉葉有三尖及細缺與石龍芮莖葉一樣但有細毛為別四五月間小黃花五出甚光艷結實狀如欲綻青桑椹如有尖峭與石龍芮子不同人以為驚不食草者大誤也方士取汁煮砂伏硫沈存中筆談所謂石龍芮有兩種水生者葉光而末圓陸生者葉毛而末銳此即葉毛者

宜辨之

附錄海薑陰命

藏器曰陶注鉤吻云海薑生海中赤色狀如石龍芮有大毒又曰陰命生

海中赤色着木懸其子有大毒今無的識者

葉及子氣味辛溫有毒主治惡瘡癰腫疼痛未潰搗  
葉傳之不得入瘡令肉爛又患瘡人以一握微碎縛  
於臂上男左女右勿令近肉即便成瘡和薑搗塗腹

破冷氣

藏器

牛扁

本經下品

釋名扁特

唐本

扁毒

唐本

集解

別錄曰牛扁生桂陽山谷弘景曰今人不復識此恭曰此藥似堇草石龍芮輩根如秦艽而細

生平澤下地田野人名為牛扁療牛虱甚太常名扁特或名扁毒保昇曰今出寧州葉似石龍芮附子等二月八月采根日乾頌曰今潞州一種便特六月有花八月結實采其根苗搗末油調殺蟻虱主療大都相似疑即扁特也但聲近而字訛耳

氣味苦微寒無毒主治身皮膚瘡熱氣可作浴湯殺牛

虱小蟲又療牛病

本經

附錄虱建草

拾遺藏器曰苦無毒主蟻虱按汁沐頭虱盡死人有誤吞虱成病者搗汁服一

小合亦主諸蟲瘡生山足濕地發葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉生水中葉如竹葉而短小可生

食亦去  
蟻虱

蕁麻

蕁音燭  
宋圖經

釋名毛蕁

時珍曰蕁字本作蕁杜  
子美有除蕁草詩是也

集解

頌曰蕁麻生江寧府山野中時珍曰川黔諸處  
甚多其莖有刺高二三尺葉似花桑或青或紫

背紫者入藥上有毛芒可畏觸人如蜂螫蠱以人  
溺濯之即解有花無實冒冬不凋按投水中能毒魚

氣味辛苦寒有大毒吐利人不止主治蛇毒搗塗之

蘇頌風疹初起以此點之一夜皆失  
時珍

格注草

唐本草

集解

恭曰出齊魯山澤間葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月采根五月六月采苗

日乾

用

氣味辛苦溫有大毒主治蠱瘡諸毒疼痛等

唐本

海芋

綱目

釋名觀音蓮

綱目

羞天草

玉冊

天荷

綱目

隔河仙

見下

集解

時珍曰海芋生蜀中今亦處處有之春生苗高四五尺大葉如芋葉而有幹夏秋間抽莖開花

如一瓣蓮花碧色花中有藥長作穗如觀音像在圓光之狀故俗呼為觀音蓮方士號為隔河仙云可變

金其根似芋魁大者如升盃長六七寸蓋野芋之類也庚辛玉冊云羞天草陰草也生江廣深谷澗邊其葉極大可以禦雨葉背紫色花如蓮花根葉皆有大毒可啜粉霜砂小者名野芋宋祁海芋贊云木幹芋葉擁腫盤戾農經弗載可以治癰

氣味辛有大毒主治瘡瘴毒腫風癩伏蝨砂

時珍

附錄透山根

時珍曰按岷嶓神書云透山根生蜀中山谷草類蘼蕪可以點鐵成金昔有人

采藥誤研此草刀忽黃軟成金也又庚辛玉冊云透山根出武都取汁點鐵立成黃金有大毒人誤食之化為紫水又有金英草亦生蜀中狀如馬齒莧而色紅摸鐵成金亦有大毒入口殺人須臾為紫水也又何遠春渚紀聞云劉均父吏部罷官歸成都都有水銀一筐過峽筐漏急取渡旁叢草塞之久而開視盡成

黃金矣宋初有軍士在澤州澤中割馬草歸鑛皆成金以草燃釜亦成黃金又臨安僧法堅言有客過於潛山中見一蛇腹脹齧一草以腹磨之而消念此草必能消脹取置篋中夜宿旅館聞隣房有人病腹脹呻吟以釜煎藥一盃與服頃之不復聞聲念已安矣至旦視之其人血肉俱化為水獨骸骨在牀兩視其釜則通體成金矣觀何氏所載即是透山根乃金英草之類如此毒草不可不知故備載之耳

鉤吻

本經下品

釋名野葛

本經

毒根

吳普

胡蔓草

圖經

斷腸草

綱目

黃藤

綱目

火

把花

弘景曰言其入口則鉤人喉吻也或言吻當作挽字牽挽人腸而絕之也時珍曰此草雖名野

葛非葛根之野者也或作治葛王充論衡云治地名也在東南其說甚通廣人謂之胡蔓草亦曰斷腸草

入人畜腹內即粘腸上半日則黑爛又名爛腸草滇人謂之火把花因其花紅而性熱如火也岳州謂之藤黃

# 集解

時珍曰鈎吻生傳高山谷及會稽東野折之青烟出者名固活二月八月采普曰秦鈎吻一名

除辛生南越山及寒石山或益州葉如葛赤莖大如箭而方根黃色正月采之恭曰野葛生桂州以南村墟間卷間皆有彼人通名鈎吻亦謂苗為鈎吻根名野葛蔓生其葉如柿其根新采者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防己皮節斷者良正與白花藤相類不深別者頗亦惑之新者折之無塵氣經年以後則有塵起從骨之細孔中出今折枸杞根亦然本草言折之青烟起者名固活為良亦不達之言也人誤食其葉者致死而羊食其苗大肥物有相伏如此博物志云鈎吻蔓生葉似鬼葵是也時珍曰嵇含南方草



木狀云野葛蔓生葉如羅勒光而厚一名胡蔓草人以雜生蔬中毒人半日輒死段成式酉陽雜俎云胡蔓草生邕州容州之間叢生花扁如卮子而稍大不成朵色黃白其葉稍黑又按嶺南衛生方云胡蔓草葉如茶其花黃而小一葉入口百竅潰血人無復生也時珍又訪之南人云鈎吻即胡蔓草今人謂之斷腸草是也蔓生葉圓而光春夏嫩苗毒甚秋冬枯老稍緩五六月間花似檉柳花數十朵作穗生嶺南者花黃生滇南者花紅呼為火把花此數說皆與吳普蘇恭說相合陶弘景等別生分辨並正于下

**正誤**

弘景曰五符經亦言鈎吻是野葛數事而言似是兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛

鳥不得集今人用合膏服之無嫌鈎吻別是一物葉似黃精而莖紫當心抽花黃色初生極類黃精故人采多感之遂致死生之反或云鈎吻是毛茛參錯不同未詳云何數曰凡使黃精勿用鈎吻真似黃精只

是葉有毛鉤子二個黃精葉似竹葉又曰凡使鉤吻  
勿用地精莖苗相同鉤吻治人身上惡毒瘡其地精  
殺人 also 恭曰鉤吻蔓生葉如柿陶言飛鳥不集者妄  
也黃精直生葉似柳及龍膽草殊非比類毛茛乃有  
毛石龍芮與鉤吻何干頌曰江南人說黃精莖苗稍  
類鉤吻但鉤吻葉頭極大而根細與蘇恭所說不同  
恐南北之產異也禹錫曰陶說鉤吻似黃精者當是  
蘇說似柿葉者別是一物也又言苗名鉤吻根名野  
葛者亦非通論時珍曰神農本草鉤吻一名野葛一  
句已明草木狀又名胡蔓草顯是藤生吳普蘇恭所  
說正合本文陶氏以藤生為野葛又指小草為鉤吻  
復疑是毛茛乃祖雷斅之說諸家遂無定見不辨其  
蔓生小草相去遠也然陶雷所說亦是一種有毒小  
草但不得指為鉤吻兩昔天姥對黃帝言黃精益壽  
鉤吻殺人乃是以二草善惡比對而言陶氏  
不審疑是相似遂有此說也餘見黃精下

氣味辛溫大有毒

普曰神農辛雷公有毒殺人時珍曰其性大熱本草毒藥止云有大

毒此獨變文曰大有毒可見其毒之異常也之才曰半夏為之使惡黃芩

主治金瘡乳瘰

中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒

本經

破癥積除脚

膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸搗汁入膏中不

入湯飲

別錄

主喉痺咽塞聲音變

吳普


發明

蘇頌曰鈎吻食葉飲冷水即死冷水發其毒也彼土毒死人懸尸樹上汁滴地上生菌子收之

名菌藥烈於野葛也蘿菜搗汁解野葛毒取汁滴野葛苗即萎死南人先食蘿菜後食野葛二物相伏自

然無苦魏武帝散野葛至尺先食此菜也時珍曰按李石續博物志云胡蔓草出二廣廣人負債急每食

此草而死以誣人以急水吞即死急慢水吞死稍緩  
或取毒蛇殺之覆以此草澆水生苗為毒藥害人葛  
洪肘後方云凡中野葛毒口不可開者取大竹筒洞  
節以頭拄其兩脇及臍中灌冷水入筒中數易水須  
臾口開乃可下藥解之惟多飲甘草汁人屎汁白鴨  
或白鵝斷頭瀝血入口中或羊血灌之嶺南衛生方  
云即時取雞卵抱未成雛者研爛和麻  
油灌之吐出毒物乃生稍遲即死也



本草綱目卷十七下